

ACIDO ACETIL SALICILICO CÁPSULAS CON MICROGRÁNULOS DE RECUBRIMIENTO ENTÉRICO 81 mg-325 mg

Lea cuidadosamente este folleto antes de administrar este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o químico farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente, si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte al farmacéutico.

1.-VIA DE ADMINISTRACION: Oral

2.- COMPOSICIÓN:

Cada cápsula con microgránulos de recubrimiento entérico contiene:

Ácido Acetilsalicílico: Según lo aprobado en Registro

Excipientes: Según lo aprobado en Registro

3.- INDICACIONES Y USO

Está indicado para tratamiento o profilaxis de enfermedades asociadas a la hiperagregabilidad plaquetaria

USOS:

Prevención del infarto al miocardio, reinfarcto y reduciendo el riesgo de accidentes cardiovasculares, cerebrovasculares, vasculares periféricos y la obstrucción de vasos sanguíneos.

4.- PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Este medicamento debe ser tomado bajo supervisión médica, antes de decidir si su uso es adecuado para usted, es necesario que su médico considere los siguientes factores:

- Su historia médica y la de su familia
- Dosis y forma de uso
- Los beneficios y riesgos al usar este medicamento

En algunos casos como presión alta no controlada, sangramientos, asma, úlceras estomacales, enfermedades hepáticas y renales, este medicamento puede ser una mala elección para usted

Debe comunicar a su médico si sufre o ha sufrido problemas de sangramiento gastrointestinal o úlceras estomacales

Se debe usar con precaución cuando existen trastornos gastrointestinales, enfermedad hepática o renal y asma bronquial.

5.-INTERACCIONES:

Con medicamentos:

El efecto de un medicamento puede ser modificado por su administración junto con otros (interacción). Es muy importante que consulte con el farmacéutico la conveniencia de usar este medicamento si está tomando otros.

El uso de este medicamento con alcohol u otros productos que contienen ácido acetilsalicílico u otros antiinflamatorios, tales como algunos medicamentos usados para el resfrío, pueden aumentar los efectos adversos de este medicamento.

No administrar en conjunto con anticoagulantes cumarínicos, heparina, puede aumentar el efecto anticoagulante. Usted debe comunicar a su médico de todos los medicamentos que está usando, incluyendo vitaminas y productos derivados de plantas, ya que algunos de estos pueden adelgazar la sangre.

El uso conjunto con clorpropamida, sulfpirazina, espiranolactona, corticoides, acidificantes urinarios, probenecid y metotrexato debe ser bajo supervisión médica.

No ingerir junto a otros medicamentos que contengan salicilatos.

En caso de requerir atención médica por otras razones no olvide mencionar que está tomando este medicamento.

Con enfermedades:

El efecto de un medicamento puede modificarse por la presencia de una enfermedad, dando lugar a efectos no deseados, algunos de ellos severos.

En caso de sufrir alguna enfermedad usted debe consultar al médico antes de ingerir este medicamento.

6.- CONTRAINDICACIONES:

No administrar niños menores de 12 años sin consultar dosis al médico.

Hipersensibilidad a alguno de los componentes.

No administrar a personas con antecedentes de alteración renal o hepática severa y cardiopatías. úlcera gastroduodenal activa, crónica o recurrente.

No administrar en pacientes que padecen desórdenes de la coagulación como hemofilia y enfermedad de Von Willebrand.

Debido a potencial hipersensibilidad cruzada con otros AINEs, no debe administrarse a pacientes que han sufrido síntomas de asma, rinitis, urticaria, pólipos nasales, angioedema, broncoespasmo y otros síntomas o reacciones alérgicas o anafilácticas fatales y asmáticas severas.

La administración a mujeres embarazadas y nodrizas debe ser según indicación médica.

7.- EFECTOS ADVERSOS :

Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se pretende obtener. Cualquier medicamento puede producir efectos no deseados especialmente si se toman por un período prolongado de tiempo y/o en dosis elevadas.

Puede presentar los siguientes síntomas: náuseas, vómitos, dispepsia, úlcera gástrica, úlcera duodenal, hemorragia gastrointestinal hematemesis, urticaria, erupciones cutáneas, angioedema, rinitis, espasmo bronquial. Si usted presenta algún síntoma, consulte a su médico.

8.- MODO DE EMPLEO y DOSIS:

Administrar vía oral.

El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiado a su caso particular, no obstante, la dosis usual recomendada es: 1 cápsula al día, los cuales deben ser ingeridos con agua sin moler o masticar los microgránulos, de preferencia después de las comidas.

Recuerde que si usted está usando este medicamento todos los días por semanas, meses o años sin supervisión médica puede hacerse un grave daño a su salud

9.- SOBREDOSIS:

Los síntomas que se pueden manifestar después de una administración masiva de Ácido Acetilsalicílico son:

Sobredosis Moderada (12,5 g al día): Tinnitus, zumbido de oídos, vértigo, alergia cutánea (sarpullido) y náuseas.

Sobredosis Severa (20 g al día): Convulsiones, hipoglicemia, hipertermia y edema pulmonar. Se debe acudir a un centro asistencial para efectuar un lavado gástrico o inducir el vómito.

10.-PRESENTACION:

Según lo aprobado en Registro

11.- CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Según lo aprobado en el Registro.

Revisado el 21 de Diciembre 2006

