

Nombre: Acido Acetilsalicílico (I) Condición de venta: sin receta médica Clasificación: Antiagregante plaquetario Disponible en:	Nombres de marca:
--	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

1.- ¿Para qué se usa?

El ácido acetilsalicílico en dosis de 100 – 300 mg se usa para prevenir el infarto cardíaco y evitar el riesgo de trombosis en pacientes con prótesis de válvulas cardíacas.

2.- Administración (oral)

- **Rango y frecuencia**

Para adultos: entre 100 y 300mg diarios según lo indique su médico.

- **Consejo de cómo administrarlo**

Debe tomarlo en conjunto con alimentos o con un vaso lleno de agua, para evitar la irritación estomacal.

3.- Precauciones

- **Mayores de 60 años**

Los problemas estomacales pueden ser severos en ancianos.

- **Consumo de alcohol**

Si usted toma alcohol durante el tratamiento con este medicamento puede aumentar el riesgo de problemas estomacales y **hemorragias**.

- **Manejo de vehículos**

Este medicamento puede causar en algunas personas mareos y / o disminuir sus capacidades mentales para reaccionar frente a **imprevistos**. Asegúrese del efecto que ejerce este medicamento sobre usted antes de manejar un vehículo o maquinaria peligrosa o realizar cualquier otra actividad riesgosa.

- **Embarazo**

Este medicamento puede causar daño al **feto**, usted debe consultar al médico, antes de usar este medicamento si está embarazada.

- **Lactancia**

Este medicamento pasa a la leche materna, por lo que debe consultar a su médico antes de usar este medicamento si está amamantando.

- **Precauciones especiales**

Este tipo de medicamentos interfiere en la **coagulación** de la sangre, por lo que se recomienda dejar de tomarlo por lo menos cinco días antes de someterse algún tipo de cirugía, a menos que su médico indique lo contrario.

4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia a este medicamento.

Si ha presentado alergia a algún excipiente de la formulación.

5.- Interacciones

- Medicamentos

Usted debe consultar con el farmacéutico la conveniencia de usar este medicamento, si está tomando otros, particularmente algún medicamento para la presión, gota como **analgésicos**, artritis, anticoagulantes como warfarina, medicamentos para la diabetes como glibenclamida, prednisona.

- Enfermedades

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el caso particular de este medicamento, si padece de **asma**, desordenes sanguíneos, **insuficiencia cardíaca congestiva**, **diabetes**, gota, **hemofilia**, alta presión sanguínea, enfermedades a los riñones, hígado, tiroides o **ulcera péptica**.

6.- Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: vómitos, agitación, fatiga extrema, confusión; reacción alérgica con dificultad para respirar, pérdida del color en la cara, escalofríos, hinchazón de la cara, ojos o párpados

Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: : mal estar estomacal, enrojecimiento, náuseas , tinnitus en los oídos, **insomnio**.

7.- Sobredosis

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: náuseas, desorientación, vómitos, fiebre, dificultad para respirar. Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

8.-Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona.

