

Nombre: Acido Ascórbico – Cafeína – Clorfenamina – Noscapina - Paracetamol	Nombres de marca:
Condición de venta: sin receta médica	
Clasificación: antigripal	
Disponible en:	

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

Composición y presentación:

- Principio Activo:
- Excipientes:

1. - ¿Para qué se usa?

Para el tratamiento de los síntomas de la gripe y el resfrío común.

2. - Administración (oral)

- **Rango y frecuencia**

Se utiliza en asociaciones de 50mg de ácido ascórbico, 40mg de cafeína, 2mg de clorfenamina, 10mg de noscapina y 650mg de paracetamol. Un comprimido o sachet cada 8 horas.

- **Consejo de cómo administrarlo**

Se aconseja tomarlo junto con las comidas y con un vaso de agua.

- **Uso prolongado**

No tome más de 7 días, si los síntomas persisten o empeoran debe consultar al médico, puede tener alguna complicación y necesitar otro medicamento.

3. - Precauciones

- **Mayores de 60 años**

Los ancianos son más sensibles a los efectos adversos de los medicamentos, por lo que debe consultar a su médico antes de tomar este medicamento.

- **Consumo de alcohol**

Debe evitar consumir alcohol mientras se encuentre en tratamiento con este medicamento, ya que este puede provocar un aumento de los efectos adversos del medicamento.

- **Manejo de vehículos**

Este medicamento puede causar en algunas personas mareos y / o disminuir sus capacidades mentales para reaccionar frente a **imprevistos**. Asegúrese del efecto que ejerce este medicamento sobre usted antes de manejar un vehículo o maquinaria peligrosa o realizar cualquier otra actividad riesgosa.

- **Embarazo**

Ud debe consultar con el médico la conveniencia de usar este medicamento si está embarazada.

- Lactancia

Este medicamento pasa a la leche materna y puede afectar al lactante. Converse con su médico la conveniencia de seguir el tratamiento o dejar de amamantar.

- Lactantes y niños

Estos pacientes son mas sensibles a los efectos adversos del medicamento, la administración debe ser previa consulta al pediatra.

- Precauciones especiales

Sólo debe utilizar este medicamento si dentro de los síntomas de resfrío presenta tos no productiva (sin flema), ya que si no tiene tos o la tos es acompañada de flemas debe utilizar un medicamento diferente a este; consulte con su farmacéutico.

Si después de unos días, sus síntomas no mejoran o empeoran debe consultar con su médico. Consulte a su médico antes de tomar este medicamento si es alérgico a algún medicamento, alimento, saborizante y / o edulcorante, o colorante.

4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia a ácido ascórbico, cafeína, clorfenamina, noscapina y / o paracetamol .

Si ha presentado alergia a algún excipiente de la formulación

5.- Interacciones

- Medicamentos

Usted debe consultar con el farmacéutico la conveniencia de usar este medicamento, si está tomando otros, particularmente antidiabéticos , otros analgésicos, antihistamínicos, antitusivos, ácido ascórbico (vitamina C) y en general si se encuentra en tratamiento con cualquier otro medicamento, ya que el consumo de este antigripal puede alterar el efecto de otros medicamentos y causarle daño a su salud.

- Enfermedades

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el caso particular de este medicamento, si padece de antecedentes de abuso de alcohol, **anemia**, **gota**, enfermedades cerebrales, colitis, convulsiones, diarrea, **fibrosis quística**, **diabetes mellitus**, **enfisema pulmonar**, **asma**, o alguna enfermedad pulmonar crónica, **hipertrofia prostática**, dificultad para orinar, **glaucoma**, **hipertensión**, alguna enfermedad a la **tiroides**.

- Exámenes de laboratorio

Si se va a someter a algún examen médico, avísele a su médico a cargo que usted se encuentra en tratamiento con este medicamento.

6.- Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico, éstos son: diarrea, pérdida del apetito, náusea o vómitos, calambres o dolor estomacal, **rash**, picazón o escalofríos, dolor de garganta y fiebre que no se habían presentado antes, mareos, ojos y piel de color amarillo, convulsiones, sequedad de boca, nariz o garganta, enrojecimiento de la cara, **alucinaciones**, dificultad para respirar, cambios en el ritmo de los latidos del corazón.

- Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: constipación, dificultad o dolor para orinar, mareos leves, sequedad de boca, nariz o garganta, aumento de la sensibilidad de la piel al sol, náuseas o vómitos, dolor estomacal, nerviosismo, palidez, irritabilidad.

7.- Sobredosis

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: calambres o dolor estomacal, diarrea, convulsiones, etc.

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

8.-Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 25°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona.