

<b>Nombre:</b> Ácido Mefenámico <b>Condición de venta:</b> con receta médica <b>Clasificación:</b> analgésico, antiinflamatorio <b>Disponible en:</b>	<b>Nombres de marca:</b>
--	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

#### 1.- ¿Para qué se usa?

Este medicamento está indicado para el alivio de dolores leves a moderados. Para aliviar dolores menstruales.

#### 2.- Administración (oral)

##### - Rango y frecuencia

Este medicamento debe ser recetado por un médico, el cual le indicará, la dosis y forma de administración más adecuada para su tratamiento. Lo recomendado es usar una dosis de 500 mg. Seguidos de 250 mg. cada 6 horas, por un período de 2 a 3 días en el caso de dismenorrea.

##### - Consejo de cómo administrarlo

Debe tomar el medicamento en conjunto con comidas para disminuir posibles molestias estomacales.

##### - Uso prolongado

No debe utilizar el medicamento por más de 7 días seguidos, a menos que su médico indique lo contrario.

El uso prolongado de este medicamento puede provocar úlceras estomacales, por lo que debe estar bajo supervisión y control periódico de su médico.

#### 3.- Precauciones

##### - Mayores de 60 años

Los problemas estomacales pueden ser más severos en pacientes mayores de 60 años. Este medicamento no está recomendado en pacientes con insuficiencia renal, así como otros AINES.

##### - Consumo de alcohol

Debe evitar el consumo de alcohol durante el tratamiento, ya que existe riesgo de provocar problemas **gastrointestinales**.

##### - Manejo de vehículos

Este medicamento puede causar en algunas personas mareos y / o disminuir sus capacidades mentales para reaccionar frente a **imprevistos**. Asegúrese del efecto que

ejerce este medicamento sobre usted antes de manejar un vehículo o maquinaria peligrosa o realizar cualquier otra actividad riesgosa.

- **Embarazo**

Puede utilizar ácido mefenámico hasta el tercer trimestre del embarazo, bajo indicación y control de su médico.

- **Lactancia**

Debe consultar al médico antes de usar este medicamento si está amamantando.

- **Lactantes y niños**

No debe utilizar ácido mefenámico en niños menores de 12 años, en el caso de utilizarlo no se debe prolongar el tratamiento por más de una semana, a menos que su pediatra indique lo contrario.

- **Precauciones especiales**

Este tipo de medicamentos interfiere en la coagulación de la sangre, por lo que se recomienda que usted deje de tomarlo por lo menos tres días antes de someterse algún tipo de cirugía.

Debe evitar exponerse al sol durante el tratamiento con este medicamento, ya que puede aumentar el riesgo de quemaduras u otras reacciones de la piel.

Usted debe consultar a su médico antes de usar este medicamento si tiene o ha tenido alguna enfermedad al corazón (como angina de pecho, infarto agudo al miocardio, insuficiencia cardíaca)

Debe comunicar a su médico si sufre o ha sufrido problemas de sangramiento gastrointestinal o úlceras estomacales

**4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:**

Si ha presentado alergias a este u otro medicamento como ácido acetilsalicílico (aspirina), u otros **antiinflamatorios** similares.

Si ha presentado alergia a algún excipiente de la formulación.

Si padece de úlcera estomacal o a sufrido hemorragias gastrointestinales recientes.

No debe usar este medicamento en el periodo inmediato a un by pass coronario

**5.- Interacciones**

- **Medicamentos**

Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta. En este caso se han descrito las interacciones con los siguientes medicamentos: antiácidos, warfarina, ciclosporina, sales de litio, digoxina, fenitoína, ácido valproico, quinolonas, probenecid y ketoconazol.

- **Enfermedades**

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa.

En el caso particular de este medicamento, si padece de **úlceras** en el estomago o intestinos, **diabetes mellitus**, **lupus eritematoso sistémico**, **anemia**, **asma**, **epilepsia**, **enfermedad de Parkinson**, **cálculos renales**, o alcoholismo.

- **Exámenes de laboratorio**

El consumo de este medicamento puede producir alteraciones en algunos exámenes de sangre y orina, por lo que debe consultar cuanto tiempo antes de efectuarse dicho examen debe dejar de tomar el medicamento.

**6.- Efectos adversos**

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: dificultad para respirar, con o sin adormecimiento de las piernas, dolor en el pecho, diarrea o vómitos con sangre, **melena**, dolor de estómago intenso, disminución en la cantidad de orina o en la frecuencia para orinar, enrojecimiento o ampollas en la piel.

- **Otros efectos**

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: náuseas, vómitos, diarrea, **constipación**, dolor de cabeza, **vértigo**, **somnolencia**, tintineo en los oídos, inusuales temblores o entumecimiento de las manos o los pies, visión azul rojiza.

**7. - Sobredosis**

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: náuseas, vómitos, dolor de cabeza severo, confusión y mal estar. Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

**8. - Condiciones de almacenamiento:**

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor, luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

**No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico**

No recomiende este medicamento a otra persona.