

| | |
|---|--------------------------|
| Nombre: Acido Salicílico – Amilo acetato Condición de venta: sin receta médica de uso tópico Clasificación: queratolítico Disponible en: | Nombres de marca: |
|---|--------------------------|

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

1.- ¿Para qué se usa?

Se utiliza para tratar desordenes de la piel, tales como **verrugas, callosidades** y en otras condiciones determinadas por su médico.

2.- Administración (tópica)

- Rango y frecuencia

La dosificación de este medicamento depende de la concentración de ácido salicílico y amilo acetato que contenga, de la forma farmacéutica y de la indicación del medicamento; por lo que debe seguir las instrucciones del envase o de su médico si este se lo recetó.

Para el tratamiento de verrugas se utiliza 1 a 2 veces al día por 3 a 5 días.

- Consejo de cómo administrarlo

Antes y después de aplicarse el medicamento debe lavar sus manos.

Debe aplicar sobre todo la zona afectada.

- Uso prolongado

El uso prolongado de este medicamento puede causar irritación de la piel, por lo que si luego de una semana los síntomas persisten debe consultar con su médico.

3.- Precauciones

- Mayores de 60 años

La piel de los ancianos es más sensible a este tipo de medicamentos, por lo que debe consultar con su médico antes de utilizarlo.

- Manejo de vehículos

Es poco probable que el medicamento afecte su capacidad de concentración y estado de alerta.

- Embarazo

Este medicamento puede ser **absorbido** por la piel, por lo que debe consultar al médico antes de usarlo si está embarazada.

- Lactancia

Este medicamento puede ser **absorbido** por la piel, por lo que debe consultar al médico antes de usarlo si está amamantando. No se han observado problemas en el lactante con el uso de este medicamento. No debe aplicar en los pechos.

- Lactantes y niños

Se recomienda consultar al médico antes de usarlo en niños, ya que la piel de los niños es más susceptible a presentar irritación con el uso de este medicamento.

- Precauciones especiales

No debe aplicar este medicamento en áreas muy extensas de piel, ni utilizarlo por periodos largos de tiempo sin consultar con su médico.

No debe ingerir este medicamento.

No debe aplicar este medicamento en los ojos o en otras zonas mucosas, tales como la boca o dentro de la nariz. Si esto ocurre accidentalmente debe lavar con agua corriente por 15 minutos.

Debe evitar su uso en lunares, marcas de nacimiento o verrugas con pelos.

Debe consultar al médico si usted ha presentado alergias a otras sustancias como **preservantes** o colorantes.

4.- Usted no debe usar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia ácido salicílico y /o amilo acetato.

Si ha presentado alergia a algún excipiente de la formulación.

5.- Interacciones

- Medicamentos

Usted debe consultar con el farmacéutico la conveniencia de usar este medicamento, si está utilizando otros, aunque al aplicarlo sobre la piel el riesgo de interacciones es bajo.

- Enfermedades

Usted debe consultar con farmacéutico la conveniencia de usar este medicamento, si padece de **diabetes mellitus**, problemas de circulación, presenta inflamación, irritación o alguna infección sobre la zona de piel donde va a aplicar el medicamento.

6.- Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: reacciones de hipersensibilidad (alergia), tales como ronchas en la piel, hinchazón, dificultad para respirar.

- Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: irritación local, sensación de quemaduras, picazón.

7.- Sobredosis

Si se aplica sobre heridas, áreas extensas de la piel o si se aplica con vendaje, existe la posibilidad de una mayor absorción y aparición de efectos adversos. Lavar con abundante agua.

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: confusión, mareos, dolor de cabeza severo o continuo, tintineo o zumbido en los oídos en forma continua, dificultad para respirar.

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

8.-Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona.