

Nombre: Ácido Salicílico - Azufre Condición de venta: sin receta médica de uso tópico Clasificación: antiacné Disponible en:	Nombres de marca:
---	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**

- **Principio Activo:**

Excipientes

1.- ¿Para qué se usa?

Se utiliza para tratar desordenes de la piel, tales como acné y seborrea, también está indicado en infecciones producidas por hongos tales como tiña versicolor.

2.- Administración (tópica)

- Rango y frecuencia

La dosificación de este medicamento depende de la concentración de ácido salicílico que contenga, de la forma farmacéutica y de la indicación del medicamento; por lo que debe seguir las instrucciones del envase o de su médico si este se lo recetó.

Para el tratamiento del acné habitualmente se utilizan concentraciones desde 0,5% a 5% de ácido salicílico + azufre hasta al 10% y se aplica de 1 a 3 veces al día.

- Uso prolongado

El uso prolongado de este medicamento puede causar irritación de la piel, o sequedad, si deja de usar el medicamento su piel debería reestablecer

3.- Precauciones

- Mayores de 60 años

La piel de los ancianos es más sensible a este tipo de medicamentos, por lo que debe consultar con su médico antes de utilizarlo.

- Manejo de vehículos

Es poco probable que el medicamento afecte su capacidad de concentración y estado de alerta.

- Embarazo

Este medicamento puede ser **absorbido** por la piel, por lo que debe consultar al médico antes de usarlo si está embarazada.

- Lactancia

Este medicamento puede ser **absorbido** por la piel, por lo que debe consultar al médico antes de usarlo si está amamantando. No se han observado problemas en el lactante con el uso de este medicamento.

- Lactantes y niños

Se recomienda consultar al médico antes de usarlo en niños, ya que la piel de los niños es más susceptible a presentar irritación con el uso de este medicamento.

- Precauciones especiales

No debe aplicar este medicamento en áreas muy extensas de piel, ni utilizarlo por periodos largos de tiempo sin consultar con su médico.

No debe aplicar este medicamento en los ojos o en otras zonas mucosas, tales como la boca o dentro de la nariz. Si esto ocurre accidentalmente debe lavar con agua corriente por 15 minutos.

Debe consultar al médico si usted ha presentado alergias a otras sustancias como **preservantes** o colorantes.

4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia a ácido salicílico y /o azufre.

Si ha presentado alergia a algún excipiente de la formulación.

Si presenta lesiones en la zona de la piel afectada (por ejemplo heridas profundas)

5.- Interacciones

- Medicamentos

Usted debe consultar con el farmacéutico la conveniencia de usar este medicamento, si está utilizando otros, aunque al aplicarlo sobre la piel el riesgo de interacciones es bajo. Particularmente si está utilizando preparaciones de uso tópico que contengan resorcinol, peróxido de benzoilo, ácido salicílico, tretinoína, alcohol.

- Enfermedades

Usted debe consultar con farmacéutico o su médico la conveniencia de usar este medicamento, si padece de alguna enfermedad que afecte sus vasos sanguíneos, si padece de diabetes mellitus, presenta inflamación, irritación o alguna infección sobre la zona de piel donde va a aplicar el medicamento.

6.- Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: irritación moderada a severa, reacciones de hipersensibilidad (alergia), tales como ronchas en la piel, hinchazón, dificultad para respirar

- Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: irritación local, sensación de quemaduras, picazón, descamación de la piel.

7.- Sobredosis

Si se aplica sobre heridas, áreas extensas de la piel o si se aplica con vendaje, existe la posibilidad de una mayor absorción y aparición de efectos adversos. Lavar con abundante agua.

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: confusión, mareos, dolor de cabeza severo o continuo, tintineo o zumbido en los oídos en forma continua, dificultad para respirar.

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

8.-Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas entre los 15-30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona.

