

Nombre: Antazolina -Bacitracina - Neomicina -Xilometazolina

Condición de venta: con receta médica

Clasificación: descongestionante nasal - antiséptico

Disponible en:

Nombres de marca:

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- Composición y presentación:
- Principio Activo:
- Excipientes:

1.- ¿Para qué se usa?

Se utiliza para el tratamiento de infecciones nasales y el alivio de la inflamación y congestión que la pueden acompañar.

Este medicamento exige diagnóstico y supervisión médica.

2.- Administración (nasal)

- Rango y frecuencia

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante se recomienda aplicar el producto 3 a 6 veces al día.

Debe evitar olvidar alguna aplicación y respetar los horarios. Si no cumple el tratamiento lo más probable es que la enfermedad se vuelva a presentar con mayor intensidad y este medicamento ya no le servirá para detener la infección.

- Consejo de cómo administrarlo

Antes y después de aplicar el medicamento debe lavarse las manos.

Debe aplicar el medicamento en ambas fosas, lo más profundamente posible (se puede ayudar con un cotonito, para una mejor aplicación).

- Uso prolongado

No use este medicamento por más de 3 días, si los síntomas continúan o empeoran, debe consultar, nuevamente, con su médico.

3.- Precauciones

- Mayores de 60 años

No existe recomendación especial para los ancianos.

- Manejo de vehículos

Es poco probable que el medicamento afecte su capacidad de concentración y estado de alerta.

- Embarazo

No se han reportado efectos adversos en el **feto**, con el uso de este medicamento en mujeres embarazadas, no obstante es preferible que usted consulte al médico antes de usar este medicamento

- Lactancia

No se ha reportado que el uso de este medicamento durante la lactancia cause daño en el niño, no obstante es preferible que consulte al médico la conveniencia de usar este medicamento si está amamantando

- Lactantes y niños

El uso de este medicamento en niños debe ser previa consulta a su pediatra, ya que los niños son más sensibles a los efectos adversos de los medicamentos.

- Precauciones especiales

Es importante que no utilice una cantidad mayor que la que se le ha indicado.

Luego de utilizar el medicamento debe limpiar el aplicador.

Este medicamento es de uso personal, no debe compartirlo con otras personas, ya que puede causar el contagio de alguna infección.

4. - Usted no debe usar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia a antazolina, bacitracina, neomicina y /o xilometazolina u otras soluciones nasales.

Si ha presentado alergia a algún excipiente de la formulación.

5. - Interacciones

- Medicamentos

Usted debe señalarle al médico todos los medicamentos que está usando ya sea con o sin receta.

- Enfermedades

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el caso particular de este medicamento, si padece de diabetes mellitus, **hipertensión**, **hipertiroidismo**, **glaucoma**, **varicela**, **herpes simple**, **herpes zoster**, **tuberculosis**.

6. - Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: dolor de cabeza, visión borrosa, intranquilidad, insomnio.

Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: ardor, sequedad nasal, estornudo, aumento de descarga nasal, picazón.

7. - Sobredosis

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: **arritmias**, dolor de cabeza, nerviosismo, dificultad para dormir. Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente. Debe llevar el envase del medicamento que se ha tomado.

8. - Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a la temperatura señalada en el envase

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona.