

Nombre: Aciclovir tópico	Nombres de marca:
Condición de venta: con receta médica	
Clasificación: antiviral	
Disponible en:	

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

1.- ¿Para qué se usa?

Es usado para tratar infecciones muco cutáneas causadas por virus del herpes simple I y II (labial y genital) y como coadyuvante en infecciones por herpes zoster.

Este medicamento exige diagnóstico y supervisión médica.

2.- Administración (tópico)

- Rango y frecuencia

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante se recomienda aplicar cada 4 horas por 4 días para el tratamiento del herpes simple y cada 4 horas por 10 días para el tratamiento del herpes zoster. La dosis o cantidad de crema deberá ser indicada por su médico tratante.

Debe evitar olvidar alguna aplicación y respetar los horarios.

Si no cumple el tratamiento lo más probable es que la enfermedad se vuelva a presentar con mayor intensidad y este medicamento ya no le servirá para detener la infección.

- Consejo de cómo administrarlo

Debe aplicarlo sobre la zona afectada en cuanto sienta los primeros síntomas de aparición del herpes. No debe ser diluido o ser usado como base para agregar otro medicamento debido a la especialidad de su formulación.

No debe ser aplicado en los ojos.

- Uso prolongado

Debe aplicar sobre la zona afectada sólo hasta que la piel recupere su aspecto normal, siguiendo las indicaciones de su médico.

No lo use por más o menos tiempo que el señalado por su médico.

3.- Precauciones

- Mayores de 60 años

No existe recomendación especial para los ancianos.

- Manejo de vehículos

Es poco probable que el medicamento afecte su capacidad de concentración y estado de alerta.

- Embarazo

Este medicamento puede ser **absorbido** por la piel, por lo que debe consultar al médico antes de usarlo si está embarazada.

- Lactancia

No se ha observado que el uso de este medicamento durante la lactancia cause daño en el niño.

- Lactantes y niños

Aciclovir no debe ser utilizado por niños menores de 2 años. La administración de este medicamento en niños menores de 12 años debe ser bajo indicación y control de su pediatra.

- Precauciones especiales

La primera dosis del medicamento, debe aplicarla lo antes posible, en el caso de infecciones recurrentes, es mejor comenzar el tratamiento al primer síntoma o apenas aparezcan las lesiones.

Las mujeres con herpes genital recurrente corren el riesgo de desarrollar cáncer cervical, por lo que debe realizarse un **PAP** por lo menos una vez al año.

Si después de unos días, sus síntomas no mejoran o empeoran debe consultar con su médico.

4.- Usted no debe usar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia a aciclovir.

Si ha presentado alergia a algún excipiente de la formulación.

5.- Interacciones

- Medicamentos

Usted debe consultar con su médico la conveniencia de usar este medicamento, si está utilizando otros, aunque al aplicarlo sobre la piel el riesgo de interacciones es bajo.

- Enfermedades

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa.

- Exámenes de laboratorio

Si se va a someter a algún examen médico, avísele a su médico a cargo que usted se encuentra en tratamiento con este medicamento.

6.- Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: reacciones de hipersensibilidad (alergia), tales como ronchas en la piel, hinchazón, dificultad para respirar.

- Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: irritación local, sensación de quemaduras, picazón.

7.- Sobredosis

Si se aplica sobre áreas extensas de la piel, existe la posibilidad de una mayor absorción y aparición de efectos adversos. Lavar con abundante agua.

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado

8.-Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 25°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona.