

Nombre: Alcanfor - Cloroxileno - Mentol Condición de venta: sin receta médica de uso tópico Clasificación: descongestivo tópico Disponible en:	Nombres de marca:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

1.- ¿Para qué se usa?

Se utiliza para el alivio de la congestión nasal, irritaciones en la piel y picaduras de insectos. Actúa refrescando y suavizando la piel.

2.- Administración (tópica)

- **Rango y frecuencia**

Puede aplicarlo 4 a 6 veces al día.

- **Consejo de cómo administrarlo**

Debe aplicar cubriendo toda la zona afectada.

3.- Precauciones

- **Mayores de 60 años**

No existe recomendación especial para los ancianos.

- **Manejo de vehículos**

Es poco probable que el medicamento afecte su capacidad de concentración y estado de alerta.

- **Embarazo**

Este medicamento se absorbe en cantidades mínimas, es poco probable que dañe al **feto**.

- **Lactancia**

No se ha observado que el uso de este medicamento durante la lactancia cause daño en el niño. No debe aplicar sobre los pechos.

- **Lactantes y niños**

El uso de este medicamento en niños debe ser previa consulta a su pediatra.

No se debe aplicar en las fosas nasales de niños pequeños ni lactantes.

- **Precauciones especiales**

Si después de unos días, sus síntomas no mejoran o empeoran debe consultar con su médico.

No debe aplicar en los ojos, si esto ocurre por casualidad lave con abundante agua.

Este medicamento es de uso externo, no debe ingerirlo, ni aplicar sobre lesiones.

4.- Usted no debe usar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia a alcanfor, cloroxileno y / o mentol.

Si ha presentado alergia a algún excipiente de la formulación.

5. - Interacciones

- Medicamentos

Usted debe consultar con el farmacéutico la conveniencia de usar este medicamento, si está utilizando otros, aunque al aplicarlo sobre la piel el riesgo de interacciones es bajo.

6. - Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: reacciones de hipersensibilidad (alergia), tales como ronchas en la piel, hinchazón, dificultad para respirar.

- Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: irritación local, sensación de quemaduras, picazón.

7. - Sobredosis

Si se aplica sobre heridas, áreas extensas de la piel o si se aplica con vendaje, existe la posibilidad de una mayor absorción y aparición de efectos adversos. Lavar con abundante agua.

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

8. - Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona.