

<b>Nombre:</b> Alopurinol <b>Condición de venta:</b> con receta médica <b>Clasificación:</b> antigotoso <b>Disponible en:</b>	<b>Nombres de marca:</b>
--	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

### 1.- ¿Para qué se usa?

Se utiliza para el tratamiento de **gota** crónica, la cual se produce por un exceso de **ácido úrico** en la sangre.

### 2.- Administración (oral)

#### - Rango y frecuencia

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es, al inicio, 100 mg aumentando cada una semana 100mg. hasta que los niveles de ácido úrico vuelvan a valores normales. Como dosis de mantención se usan dosis de 100 a 200 mg. 2-3 veces por día ó 300 mg. como dosis única diaria. En gota moderada se recomienda usar dosis de 200-300 mg diarios y en casos severos de gota se utilizan dosis de 600 mg. por día. La dosis máxima recomendada es de 800 mg. diarios.

#### - Consejo de cómo administrarlo

Se recomienda que tome el medicamento junto con comida o con un vaso de leche para evitar la irritación estomacal.

#### - Uso prolongado

Debe usarlo durante el tiempo que su médico lo señale, respetando los horarios y las dosis. Es aconsejable que durante el tratamiento con alopurinol visite regularmente a su médico para que éste evalúe su estado de salud.

### 3.- Precauciones

#### - Mayores de 60 años

Los ancianos son más sensibles a los efectos adversos de los medicamentos, por lo que debe seguir las indicaciones de su médico durante el tratamiento con alopurinol.

#### - Consumo de alcohol

Evite el consumo de alcohol mientras está en tratamiento con este medicamento, ya que este provoca un aumento de ácido úrico en la sangre y puede empeorar su enfermedad.

#### - Manejo de vehículos

Asegúrese del efecto que tiene sobre usted este medicamento, antes de manejar un vehículo o maquinaria peligrosa.

#### - Embarazo

Este medicamento puede causar daño al **feto**, usted debe conversar con su médico sobre la conveniencia de usar este medicamento si está embarazada o desea estarlo.

#### - Lactancia

Este medicamento pasa a la leche materna, por lo que debe discutir con su médico la conveniencia de usar este medicamento o de suprimir la lactancia.

#### - Lactantes y niños

El uso de este medicamento en niños debe ser previa consulta a su pediatra.

#### - Precauciones especiales

Si después de una semana, sus síntomas no mejoran o empeoran debe consultar con su médico.

No debe dejar de tomar este medicamento sin la autorización de su médico, ya que se puede presentar un empeoramiento de los síntomas de su enfermedad.

Se recomienda que la dosis de este medicamento sea ajustada si usted presenta insuficiencia renal. Consulte con su médico.

Para evitar la aparición de **cálculos renales**, se recomienda tomar mucho líquido (2 litros al día), y evitar el consumo de grandes dosis de vitamina C.

#### 4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia a alopurinol.

Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.

#### 5.- Interacciones

##### - Medicamentos

Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta. En este caso se han descrito las interacciones con los siguientes medicamentos: azatiprima, mercaptopurina, warfarina, acenocumarol.

##### Enfermedades

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el caso particular de este medicamento, si padece de **diabetes mellitus**, **hipertensión**, **insuficiencia cardíaca congestiva**.

##### - Alimentos

Se debe evitar consumir alimentos como sardinas, legumbres, hígado, riñones, pollo, pan dulce, para prevenir ataques de gota.

#### 6.- Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: **rash** o úlceras, ronchas o picazón (estos pueden presentarse semanas o meses después de haber tomado el medicamento), heces negras u oscuras, úlceras sangrantes en los labios, sangre en la orina, escalofríos, fiebre, dolor muscular, náuseas o vómitos, especialmente si estos ocurren junto con **rash**, dificultad o dolor al orinar, manchas rojas en la piel, quemazón o descamación de la piel, ojos rojos o irritados, dificultad para respirar, úlceras o puntos blancos en la boca o en los labios, dolor de garganta y fiebre, inflamación del área estomacal, inflamación de la cara, dedos, pies o piernas, aumento y dolor de los **ganglios**, hemorragias y moretones inusuales, debilidad, ganancia de peso rápidamente, piel u ojos de color amarillo.

#### - Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: diarrea, somnolencia, dolor de cabeza, indigestión, náuseas, dolor estomacal, pérdida del cabello.

#### 7.- Sobredosis

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: dolor abdominal severo, náuseas y vómitos.

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

#### 8.-Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

#### **No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico**

No recomiende este medicamento a otra persona.