

<b>Nombre:</b> Amiodarona <b>Condición de venta:</b> con receta médica <b>Clasificación:</b> antiarritmico <b>Disponible en:</b>	<b>Nombres de marca:</b>
---	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

### 1.- ¿Para qué se usa?

Amiodarona es usada para el tratamiento y control de arritmias auriculares, ventriculares, aurículo ventriculares y arritmias debidas al síndrome de Wolf-Parkinson-White.

### 2.- Administración (oral)

#### - Rango y frecuencia

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es: 600 a 1200 mg. al día por un período de 1 a 2 semanas. La dosis de mantención suele ser los 400 mg. Con dosis sobre los 1000 mg. se pueden observar efectos adversos gastrointestinales por lo que se puede fraccionar las dosis con las comidas. Generalmente este medicamento necesita una dosis de carga, ya que por su larga vida media demora algunos días en alcanzar niveles útiles en la sangre.

#### - Consejo de cómo administrarlo

Se recomienda tomar el medicamento junto con bastante líquido o con las comidas para minimizar el riesgo de mal estar estomacal.

#### - Uso prolongado

Debe usarlo durante el tiempo que su médico se lo señale, respetando los horarios y las dosis. Se recomienda que acuda regularmente donde su médico para que evalúe su tratamiento. No debe interrumpir el tratamiento, aunque los síntomas hayan desaparecido, sin antes consultar con su médico.

### 3.- Precauciones

#### - Mayores de 60 años

Los ancianos son más sensibles a los efectos adversos de los medicamentos, se pueden presentar dificultad para caminar, y entumecimiento, hormigueo, temblor o debilidad en las manos o pies,

#### - Consumo de alcohol

Evite el consumo de alcohol mientras está en tratamiento con este medicamento, ya que se aumentan los riesgos de efectos adversos de amiodarona.

#### - Manejo de vehículos

Asegúrese del efecto que tiene sobre usted este medicamento, antes de manejar un vehículo o maquinaria peligrosa.

#### - Embarazo

Este medicamento puede causar daño al **feto**, usted debe asegurarse de que su doctor sabe que está embarazada o en riesgo de estarlo. Si se embaraza mientras está en tratamiento, llame a su doctor

#### - Lactancia

Este medicamento pasa a la leche materna, sin embargo, no se ha observado que su uso durante la lactancia cause daño en el niño. Converse con su médico la conveniencia de seguir el tratamiento o dejar de amamantar.

#### - Lactantes y niños

Este medicamento puede causar efectos adversos severos en el niño, el pediatra debe evaluar el **riesgo/beneficio** de su administración.

#### - Precauciones especiales

- Este medicamento puede causar daño a los pulmones, si usted experimenta algunos de los síntomas siguientes: dificultad para respirar, tos, consulte inmediatamente con su médico.

- Usted debe visitar periódicamente a su médico, puede requerir un ajuste de dosis, es probable que lo envíe a hacerse exámenes de sangre, radiografías, electrocardiogramas

- Este medicamento puede causar una mayor sensibilidad de su piel al sol, presentándose síntomas como picazón **rash**, decoloración de la piel, o quemaduras severas en la piel por el sol. Por lo que se recomienda no tomar sol en forma directa especialmente entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde, y utilizar un factor solar 15.

- Antes de realizarse una cirugía (incluso dental) o tratamiento de emergencia debe avisar al médico que se encuentra en tratamiento con este medicamento.

- Consulte a su médico antes de tomar amiodarona si usted sufre al gún tipo de daño añ hígado o a la tiroides.

#### 4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia a amiodarona .

Si ha presentado alergia a algún excipiente de la formulación.

#### 5.- Interacciones

##### - Medicamentos

Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta. En este caso se han descrito las interacciones con los siguientes medicamentos: warfarina, acenocumarol, fenitoina, teofilina.

##### - Enfermedades

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa.

En el caso particular de este medicamento, si padece de algún problema a la tiroides.

#### 6.- Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: tos, dolor para respirar, dificultad para respirar, fiebre, entumecimiento o hormigueo en los dedos de pies o manos, sensibilidad de la piel a la luz solar, temblor o movimiento de las manos, dificultad para caminar, movimientos del cuerpo inusuales e incontrolados, debilidad de brazos o piernas.

Este medicamento puede causar un severo daño al hígado, ud. debe recurrir al médico en forma urgente si presenta los síntomas siguientes: dolor de estómago, pérdida del apetito, vómitos, orina oscura, debilidad, cansancio, color amarillo de ojos o piel, hinchazón de la cara.

#### - Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: constipación, dolor de cabeza, pérdida del apetito, náuseas y vómitos leves, sabor metálico o amargo en la boca, disminución del deseo sexual, mareos, enrojecimiento de la cara.

#### 7.- Sobredosis

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: convulsiones, ritmo irregular del corazón, pérdida de la conciencia. Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

#### 8.-Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas entre los 15-30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

#### **No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico**

No recomiende este medicamento a otra persona.