

Nombre: Atenolol Condición de venta: con receta médica Clasificación: hipotensor Disponible en:	Nombres de marca:
--	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente.

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

1.- ¿Para qué se usa?

Se utiliza para el tratamiento de la **hipertensión** arterial y como profilaxis de crisis anginosas.

2.- Administración (oral)

- Rango y frecuencia

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es:

Hipertensión arterial: 25- 50 mg. una vez al día sólo o en conjunto con algún diurético según su médico indique, si es necesario la dosis puede aumentarse a 100 mg. diarios.

Angina crónica estable: 50 mg. una vez al día, si en una semana no se obtiene buena respuesta se puede aumentar la dosis a 100 mg. diarios.

- Consejo de cómo administrarlo

Debe tomarlo con el estómago vacío. Además debe evitar el consumo de alcohol y cafeína.

No suspenda este medicamento sin previa consulta a su médico aunque se sienta mejor, puede que sea necesario ir disminuyendo la dosis que usted toma gradualmente. Recuerde que la hipertensión generalmente es asintomática, pero puede traer muchas complicaciones si no se maneja adecuadamente.

- Uso prolongado

Este medicamento es usado durante periodos prolongados, pero debe usarlo bajo supervisión médica acudiendo a control en forma periódica.

3.- Precauciones

- Mayores de 60 años

Los ancianos son más sensibles a los efectos adversos de los medicamentos, por lo que debe seguir las indicaciones de su médico durante el tratamiento con atenolol. En pacientes que presentan algún tipo de daño renal puede ser necesario disminuir la dosis, consulte con su médico si presenta este tipo de complicaciones.

- Consumo de alcohol

Usted debe evitar el consumo de alcohol, mientras se encuentre en tratamiento con este medicamento, ya que se aumenta el riesgo de efectos adversos del alcohol y del medicamento.

- Manejo de vehículos

Este medicamento puede causar en algunas personas mareos y / o disminuir sus capacidades mentales para reaccionar frente a **imprevistos**. Asegúrese del efecto que ejerce este medicamento sobre usted antes de manejar un vehículo o maquinaria peligrosa o realizar cualquier otra actividad riesgosa.

- Embarazo

Este medicamento puede causar daño al **feto**, usted debe discutir con su médico la conveniencia de usar este medicamento en el caso de estar embarazada.

- Lactancia

Este medicamento pasa a la leche materna y puede afectar al lactante. Converse con su médico la conveniencia de seguir el tratamiento o dejar de amamantar.

- Lactantes y niños

No se debe utilizar en niños, a menos que su pediatra así lo indique.

- Precauciones especiales

Atenolol puede hacerle más sensible al frío, especialmente si tiene problemas circulatorios. El atenolol es una sustancia prohibida en el deporte de competición y puede dar positivo en un control de **dopaje**.

Este medicamento puede enmascarar los síntomas de una hiperglicemia, hable de este tema con su médico si usted presenta diabetes y está en tratamiento.

4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si padece de **bloqueo cardíaco**, **bradicardia** intensa o **shock cardiogénico**.

Si ha presentado síntomas de alergia a este u otro medicamento **betabloqueador**.

Si ha presentado alergia a algún excipiente de la formulación.

5.- Interacciones

- Medicamentos

Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta. En este caso se han descrito las interacciones con los siguientes medicamentos: ampicilina, antiácidos, glibenclamida, ácido acetilsalicílico y otros antiinflamatorios, dipiridamol, neostigmina, quinidina, clonidina, aminofilina, teofilina, clorfenamina, insulina, reserpina y propranolol, medicamentos para tratar el asma como es el caso de salbutamol.

- Enfermedades

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el caso particular de este medicamento, si padece de **acidosis metabólica**, **asma** u otras enfermedades **broncoespásticas**, **cardiopatía isquémica**, depresión, **diabetes** (atenolol puede enmascarar síntomas de baja de **glucosa**), **enfermedad de Raynaud**, **feocromocitoma**, **hipertiroidismo**, **insuficiencia cardíaca**, **miastenia gravis**, **soriasis**.

- Exámenes de laboratorio

Se pueden ver afectados diversos resultados de exámenes sanguíneos y pruebas de diagnóstico, por lo que debe informar que está utilizando este medicamento antes de realizarse algún examen.

6. - Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico:

depresión, dificultad para respirar, disminución de los latidos cardíacos, dolor en el pecho, hinchazón de tobillos, pies o piernas.

- Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: fatiga, mareos, dolor de cabeza, **insomnio**.

7. - Sobredosis

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: dificultad para respirar, disminución de los latidos cardíacos, **presión arterial** muy baja. Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

8. - Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas menores a 25°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona.