

Nombre: Atropina sulfato - Papaverina Condición de venta: con receta médica Clasificación: antiespasmódico Disponible en:	Nombres de marca:
---	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

1.- ¿Para qué se usa?

Este medicamento es utilizado en el tratamiento sintomático de los espasmos intestinales, del cólico renal, cólico biliar y dismenorrea. Tratamiento sintomático de la sudoración y salivación excesivas.

2.- Administración (oral)

- Rango y frecuencia

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es:

- ❖ **Adultos:** 0.5 mg. de atropina y 40 mg. de papaverina (1 comprimido) 3 o 4 veces al día. La dosis diaria no debe sobrepasar los 3.0 mg. de atropina y los 240 mg. de papaverina(6 comprimidos).
- ❖ **Niños:** la dosis recomendada es 0.125 mg. de atropina y 10 mg. de papaverina (¼ de comprimido).

- Uso prolongado

Si los síntomas persisten o se intensifican debe consultar con su médico, ya que se puede estar ocultando una enfermedad más grave.

3.- Precauciones

- Mayores de 60 años

Los ancianos son más sensibles a los efectos adversos de los medicamentos, por lo que debe seguir las indicaciones de su médico durante el tratamiento con atropina.

- Manejo de vehículos

Asegúrese del efecto que tiene sobre usted este medicamento, antes de manejar un vehículo o maquinaria peligrosa, ya que este medicamento puede causar visión borrosa.

- Embarazo

Este medicamento puede causar daño al **feto** (aumento en el ritmo cardiaco), usted debe consultar al médico, antes de usar este medicamento si está embarazada.

- Lactancia

Debe consultar al médico antes de usar este medicamento si está amamantando, ya que se puede producir una disminución del flujo de leche en algunas mujeres.

- Lactantes y niños

El uso de este medicamento en niños debe ser previa consulta a su pediatra, ya que puede causar reacciones adversas como **hiperexcitabilidad** en niños.

4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia a atropina sulfato.

Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.

Si usted tiene glaucoma, problemas prostáticos, o algunos problemas en la digestión.

5.- Interacciones

- Medicamentos

Usted debe consultar con el farmacéutico la conveniencia de usar este medicamento, si está tomando otros, particularmente prednisona, haloperidol, amantadina, imipramina, clorfenamina, loratadina, metoclopramida, buclizina, ciclizina, ciclobenzaprina, ipratropio, loxapina, maprotilina, meclizina, metilfenidato, orfenadrina, fenotiazinas, pimozida, procainamida, antiácidos, antidiarreicos, ciclopropano, guanadrel, guanetidina, reserpina, ketoconazol, apomorfina, carbamazepina, lorazepam.

- Enfermedades

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el caso particular de este medicamento, si padece de **glaucoma**, **miastenia gravis**, **taquicardia**, retención urinaria, **megacolon**, **hipertrofia prostática**, problemas a la vejiga, daño cerebral, colitis, fiebre, **hernia hiatal**, **hipertensión**, alguna enfermedad pulmonar crónica, dificultad para orinar, **síndrome de Down**, **hipotiroidismo**, angina de pecho.

6.- Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: taquicardia, dificultad para respirar, confusión, mareos, rash, dolor de ojos, convulsiones, somnolencia, sequedad de boca, nariz o garganta, fiebre, alucinaciones, excitación, nerviosismo, irritabilidad, visión doble.

- Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: somnolencia, sensación de mal estar, confusión, visión borrosa, constipación, dificultad para orinar, dolor de cabeza, enrojecimiento del rostro.

7.- Sobredosis

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: sequedad de boca, dificultad para orinar,

taquicardia, somnolencia, cansancio severo, visión borrosa, mareos, fiebre, alucinaciones, convulsiones.

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

8.-Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona.