

**Nombre:** Betametasona tópica

**Condición de venta:** con receta  
médica

**Clasificación:** antiinflamatorio  
tópico

**Disponible en:**

**Nombres de marca:**

**Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.**

**Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente**

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

### **1. - ¿Para qué se usa?**

Este medicamento está indicado para el alivio de las manifestaciones inflamatorias y pruríticas de las dermatosis que responden a corticoesteroides.

### **2. - Administración (tópico)**

#### **- Rango y frecuencia**

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante se recomienda aplicar la crema 2 a 3 veces al día.

Este medicamento debe ser recetado por un médico, el cual le indicará, la dosis y forma de administración más adecuada para su tratamiento.

#### **- Consejo de cómo administrarlo**

Debe aplicar una capa fina de crema sobre la zona afectada. Debe lavar sus manos antes y después de cada aplicación.

Debe evitar el contacto de la crema con los ojos, en sus zonas próximas o en otras mucosas.

No debe colocar vendajes o gasas sobre la zona afectada, a menos que su médico lo indique.

#### **- Uso prolongado**

No lo use por periodos prolongados de tiempo y/o en áreas extensas de la piel. Su uso prolongado puede favorecer la aparición de infecciones por hongos.

Evite usarlo en zonas cercanas a los ojos y en el rostro en general, sobre zona genital o rectal y en pliegues de la piel.

Use este medicamento sólo en la frecuencia y cantidad señalada por su médico.

### **3. - Precauciones**

#### **- Mayores de 60 años**

Estos pacientes son más sensibles a los efectos adversos del medicamento, el médico debe ir evaluando cuidadosamente la cantidad a aplicar y la frecuencia.

#### **- Embarazo**

Este medicamento se **absorbe** por la piel y puede dañar al feto, por lo que debe hablar con su médico la conveniencia de usar este medicamento si está embarazada.

#### **- Lactancia**

Este medicamento es absorbido por la piel y puede pasar a la leche materna, por lo que debe discutir con su médico la conveniencia de usar este medicamento si está amamantando. No debe aplicar este medicamento en el pecho antes de amamantar al niño.

#### **- Lactantes y niños**

Se debe evitar aplicar en áreas extensas de la piel o por periodos prolongados de tiempo, el pediatra debe evaluar la necesidad de usar este medicamento en su niño.

#### - Precauciones especiales

No debe utilizar este medicamento para el tratamiento de **acné**, quemaduras, infecciones o desordenes de pigmentación.

#### 4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

En caso de presentar reacciones alérgicas a betametasona u otro **corticoides**.

Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.

#### 5.- Interacciones

##### - Medicamentos

Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta. En este caso se han descrito las interacciones con los siguientes medicamentos: no debe aplicar, junto a betametasona, preparaciones que contengan alcohol sobre la zona afectada.

##### - Enfermedades

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el caso particular de este medicamento, si padece de **varicela**, **herpes simple**, **herpes zoster**, **tuberculosis**.

#### 6.- Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: reacciones de hipersensibilidad (alergia), tales como ronchas en la piel, hinchazón, dificultad para respirar.

##### - Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: aparición de ampollas o erupciones en la piel, cambios del color de la piel, excesivo crecimiento de pelo en la zona, sensación de quemazón y picor en la piel, disminución del espesor de la piel.

#### 7.- Sobredosis

Si se aplica sobre heridas, áreas extensas de la piel o si se aplica con vendaje, existe la posibilidad de una mayor absorción y aparición de efectos adversos. Lavar con abundante agua. Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

#### 8.- Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

#### **No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico**

No recomiende este medicamento a otra persona.