

Nombre: Bromazepam Condición de venta: con receta médica retenida Clasificación: ansiolítico Disponible en:	Nombres de marca:
--	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

1.- ¿Para qué se usa?

Este medicamento es un tipo de **Benzodiazepina**, destinado a tratar ansiedad, insomnio.

2.- Administración (oral)

- Rango y frecuencia

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es:

Tratamiento ambulatorio: hasta 3 dosis diarias de 1.5 o 3 mg.

En casos más severos las dosis pueden ser aumentadas a 6-12 mg. diarios repartidos en 2 o 3 tomas al día.

- Consejo de cómo administrarlo

Se recomienda que tome el medicamento junto a las comidas para evitar problemas estomacales.

- Uso prolongado

En general, debe evitar usarlo por periodos superiores de 3 a 6 semanas de tratamiento; debe tomarlo solamente por el periodo de tiempo señalado por su médico. El uso prolongado de este medicamento causa **dependencia**, la suspensión del medicamento no debe ser brusca, ya que puede producir un **síndrome de abstinencia** caracterizado por **ansiedad**, agitación, temblores, **insomnio**.

3.- Precauciones

- Mayores de 60 años

Los ancianos son más sensibles a los efectos adversos de los medicamentos, por lo que debe tener especial precaución si se encuentra en tratamiento con bromazepam.

- Consumo de alcohol

Evite el consumo de alcohol mientras está en tratamiento con este medicamento, ya que se aumentan los riesgos de efectos adversos, principalmente a nivel del **sistema nervioso central** (dificultad para concentrarse, depresión y otros).

- Manejo de vehículos

Este medicamento disminuye su estado de alerta y su capacidad de reaccionar frente a imprevisto, por lo tanto evite manejar vehículos, maquinaria peligrosa o realizar cualquier otra actividad de riesgo mientras se encuentre en tratamiento con este medicamento.

- Embarazo

Este medicamento puede causar daño al **feto**, usted debe consultar al médico, antes de usar este medicamento si está embarazada.

- Lactancia

Este medicamento pasa a la leche materna y puede afectar al lactante. Converse con su médico la conveniencia de seguir el tratamiento o si debe dejar de amamantar.

- Lactantes y niños

No se recomienda utilizar en niños menores de 12 años. Los niños son más sensibles a los efectos adversos del medicamento. El uso de bromazepam en niños es posible solo en las condiciones determinadas por su pediatra.

- Precauciones especiales

No debe interrumpir bruscamente el tratamiento, su médico le debe indicar la forma en que debe ir reduciendo la dosis a tomar.

Se puede producir olvido de acontecimientos recientes por efecto de este medicamento.

Nunca se deben tomar dosis mayores que las recomendadas por su médico.

4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia a bromazepam o cualquier otra **benzodiazepina**.

Si ha presentado alergia a algún excipiente de la formulación.

No debe usarlo si sufre o ha sufrido de **miastenia gravis**, **intoxicación** etílica aguda, coma o **shock**.

5.- Interacciones

- Medicamentos

Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta. En este caso se han descrito las interacciones con los siguientes medicamentos: anticonceptivos orales, alcohol etílico, aminofilina, clozapina, levodopa, loxapina, ácido valproico, zidovudina, carbamazepina, cimetidina, depresores del sistema nervioso central como clorfenamina, fenobarbital, pseudoefedrina, medicamentos para el resfrío, etc.

- Enfermedades

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el caso particular de este medicamento, si padece de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, **glaucoma**, antecedentes de abuso de drogas, **miastenia gravis**, depresión, **apnea de sueño**, **epilepsia**, **porfiria**.

- Exámenes de laboratorio

Si se va a someter a algún examen médico, avísele a su médico a cargo que usted se encuentra en tratamiento con este medicamento.

6.- Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: dificultad para concentrarse, depresión, **alucinaciones**, disminución de la **presión arterial**, confusión, debilidad muscular, **rash** o picazón de la piel, sequedad de garganta, fiebre y escalofríos, **ulceras** en la garganta o la boca, moretones o **hemorragias** inusuales, fatiga extrema, ojos o piel de color amarillo.

- Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al

medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: **somnolencia**, pérdida de la coordinación, mareos, dolor de cabeza en presencia de luz, inestabilidad para caminar, diarrea leve, **estreñimiento**, cambios en el apetito sexual.

7. - Sobredosis

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: **somnolencia** extrema, confusión, dificultad para respirar, reflejos más lentos, pobre coordinación, temblor, pérdida de la conciencia. Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la intoxicación y tratarla adecuadamente. Debe llevar el envase del medicamento que se ha tomado.

8. -Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico
No recomiende este medicamento a otra persona.