

<b>Nombre:</b> Bromelina <b>Condición de venta:</b> sin receta médica <b>Clasificación:</b> antiinflamatorio <b>Disponible en:</b>	<b>Nombres de marca:</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

#### 1.- ¿Para qué se usa?

Se utiliza para el tratamiento **coadyuvante** de inflamaciones y **edemas** (hinchazón) asociados a un golpe o cirugía.

#### 2.- Administración (oral)

- **Rango y frecuencia**

Dosis adultos: 44 mg 3 a 4 veces al día.

Dosis niños de 6 a 15 años: 44 mg 1 a 2 veces al día.

- **Consejo de cómo administrarlo**

Se recomienda tomarlo junto con las comidas para así evitar molestias estomacales.

- **Uso prolongado**

No debe utilizar este medicamento por más de 7 días, si transcurrido este tiempo los síntomas no presentan mejoría debe consultar con su médico.

#### 3.- Precauciones

- **Mayores de 60 años**

No existe recomendación especial para los ancianos.

- **Manejo de vehículos**

Es poco probable que el medicamento afecte su capacidad de concentración y estado de alerta.

- **Embarazo**

Debe consultar con su médico antes de utilizar este medicamento si se encuentra embarazada.

- **Lactancia**

Debe consultar al médico antes de usar este medicamento si está amamantando.

- **Lactantes y niños**

El uso de este medicamento en niños debe ser previa consulta a su pediatra.

No se recomienda utilizar este medicamento en niños menores de 6 años.

- **Precauciones especiales**

Si después de unos días, sus síntomas no mejoran o empeoran debe consultar con su médico.

Este medicamento puede causar un aumento de la frecuencia cardíaca en algunos pacientes, por ello, si usted padece de algún problema al corazón, consulte a su médico.

#### **4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:**

Si ha presentado síntomas de alergia a bromelina o papaína.

Si ha presentado alergia a algún excipiente de la formulación.

#### **5.- Interacciones**

##### **- Medicamentos**

Usted debe consultar con el farmacéutico la conveniencia de usar este medicamento, si está tomando otros, particularmente warfarina, acenocumarol, ticlopidina, dipiridamol.

##### **- Enfermedades**

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el caso particular de este medicamento, si padece de **arritmias** cardíacas, **hemofilia** o problemas de **coagulación sanguínea**.

#### **6.- Efectos adversos**

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: **eritema**, **prurito**, **rash**, **asma**, náuseas, vómitos, dolor estomacal, aumento de la **frecuencia cardíaca**, **hemorragia** vaginal, **menstruaciones** con mayor flujo.

##### **- Otros efectos**

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: dolor estomacal, náuseas.

#### **7.- Sobredosis**

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: **taquicardia**, dificultad para respirar, náuseas, vómitos, dolor estomacal.

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

#### **8.-Condiciones de almacenamiento:**

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

**No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico**

**No recomiende este medicamento a otra persona.**

