

<b>Nombre:</b> Bromhexina <b>Condición de venta:</b> sin receta médica <b>Clasificación:</b> Mucolítico, expectorante. <b>Disponible en:</b>	<b>Nombres de marca:</b>
---	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

#### 1.- ¿Para qué se usa?

Este medicamento es utilizado como terapia secretolítica en enfermedades bronco pulmonares crónicas y agudas asociadas a secreción mucosa anormal y trastornos del transporte mucoso.

#### 2.- Administración (oral)

##### - Rango y frecuencia

Dosis adultos y niños mayores de 10 años: 4 a 8 mg cada 8 horas.

Dosis niños menores de 10 años: 0,5 mg por kilogramo de peso al día divididos cada 8 horas.

##### - Consejo de cómo administrarlo

Se recomienda que tome el medicamento después de las comidas.

En el caso de los comprimidos, debe tomarlos con abundante líquido, cuando se trata de jarabes debe tomarlo con la cuchara de dosificación que adjunte el envase, de lo contrario lo más recomendable es que utilice una jeringa sin aguja (limpia, sin uso previo) para administrar la dosis exacta.

##### - Uso prolongado

Si persiste o se intensifica la tos después de 7 días de tratamiento consulte con su médico, ya que se puede estar ocultando una enfermedad severa.

#### 3.- Precauciones

##### - Embarazo

Este medicamento puede causar daño al **feto**, usted debe consultar al médico, antes de usar este medicamento si está embarazada.

##### - Lactancia

Este medicamento pasa a la leche materna y puede afectar al lactante. Converse con su médico la conveniencia de seguir el tratamiento o dejar de amamantar.

##### - Lactantes y niños

El uso de este medicamento en niños debe ser previa consulta a su pediatra.

##### - Precauciones especiales

Si padece **asma** bronquial puede ser necesaria la administración de otros medicamentos antes de usar bromhexina.

#### **4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:**

Si ha presentado síntomas de alergia al medicamento o a ambroxol en otras ocasiones.

Si ha padecido de alergia a algún excipiente de la formulación.

No debe utilizar bromhexina para el alivio de la tos crónica ocasionada por el cigarrillo, **asma**, **enfisema** o en toses secas.

#### **5.- Interacciones**

##### **- Medicamentos**

Usted debe consultar con el farmacéutico la conveniencia de usar este medicamento, si está tomando otros, particularmente atropina.

##### **- Enfermedades**

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, cardiovascular o cualquier otra enfermedad crónica y severa.

En el caso particular de este medicamento, si padece de **úlceras gastrointestinales**.

#### **6.- Efectos adversos**

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: ronchas, **edema**, picazón, dificultad para respirar, náusea, mareos, **dispepsia**, diarrea.

##### **- Otros efectos**

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: molestias **gastrointestinales**, mareos, sudoración.

#### **7.- Sobredosis**

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la intoxicación y tratarla adecuadamente. Debe llevar el envase del medicamento que se ha tomado.

#### **8.- Condiciones de almacenamiento:**

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

#### **No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico**

No recomiende este medicamento a otra persona.