

<b>Nombre:</b> Cafeína – Clorfenamina – Ergotamina – Metamizol sódico <b>Condición de venta:</b> con receta médica <b>Clasificación:</b> antimigrañoso <b>Disponible en:</b>	<b>Nombres de marca:</b>
--	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

### 1.- ¿Para qué se usa?

Esta asociación de medicamentos se utiliza para el tratamiento de la cefalea vascular (migraña), cefalea histamínica y condiciones relacionadas donde la distensión de los vasos craneanos parece ser la causa.

### 2.- Administración (oral)

#### - Rango y frecuencia

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es: 1-2 mg de ergotamina, 300-600 mg. de metamizol sódico, 1-2 mg. de clorfenamina maleato, 100-200 mg. de cafeína (1 a 2 comprimidos) al inicio de la jaqueca y luego 1 comprimido cada ½ hora hasta tener un alivio total. La dosis total diaria en el adulto no debe exceder los 4 comprimidos y a la semana no debe exceder los 12 comprimidos.

#### - Consejo de cómo administrarlo

Se recomienda tomar el medicamento junto con las comidas para evitar mal estar estomacal.

Para aumentar la efectividad del medicamento se recomienda que tome el medicamento en cuanto sienta los primeros signos de mal estar. Debe quedarse tranquilo, idealmente en una habitación oscura hasta que se sienta mejor.

#### - Uso prolongado

Debe usarlo durante el tiempo que su médico se lo señale, respetando los horarios y las dosis. No debe utilizar este medicamento durante un periodo prolongado o en altas dosis, a menos que su médico lo haya indicado.

Si utiliza este medicamento por un tiempo prolongado, puede perder su efectividad y causar dependencia física, lo cual puede provocar que los dolores de cabeza reaparezcan.

### 3.- Precauciones

#### - Mayores de 60 años

Los ancianos son más sensibles a los efectos adversos de este medicamento; que pueden ser dificultad para orinar, confusión, mareos, irritabilidad, sequedad de boca, nariz y garganta, por lo que se recomienda una especial vigilancia.

#### - Consumo de alcohol

Debe evitar tomar alcohol mientras esté en tratamiento con este medicamento, ya que se intensifican los efectos adversos tales como somnolencia, fatiga.

#### - Manejo de vehículos

Este medicamento puede causar en algunas personas mareos, **somnolencia** y / o disminuir sus capacidades mentales para reaccionar frente a **imprevistos**. Asegúrese del efecto que ejerce este medicamento sobre usted antes de manejar un vehículo o maquinaria peligrosa o realizar cualquier otra actividad riesgosa.

#### - Embarazo

Este medicamento puede causar daño al **feto** incluso la muerte de este, por lo que no debe tomarse este medicamento durante el embarazo.

#### - Lactancia

Este medicamento pasa a la leche materna y puede causar vómitos, diarrea, cambios en el pulso, convulsiones y problemas para dormir en el lactante, por lo que debe discutir con su médico la conveniencia de usar este medicamento o de suprimir la lactancia.

#### - Lactantes y niños

Los niños son mas sensibles a los efectos adversos de este medicamento, el pediatra debe evaluar el tratamiento recomendable para su niño. No debe utilizarse en niños menores de 12 años.

#### - Precauciones especiales

Si después de unos días, sus síntomas no mejoran o empeoran debe consultar con su médico.

Debe evitar fumar cigarrillos, ya que esto puede aumentar la intensidad de los dolores de cabeza o la aparición de estos.

Durante el tratamiento con este medicamento puede aumentar su sensibilidad al frío, ya que disminuye el flujo de sangre hacia la piel y los dedos de pies y manos, por lo que se recomienda utilizar ropa abrigada.

Debe avisar a su médico si presenta síntomas como fiebre y ulceraciones bucales.

Este medicamento puede causar sequedad de boca, la cual puede aliviarse chupando caramelos.

Antes de hacerse un examen de alergia a la piel debe avisarle al profesional de la salud a cargo que usted está tomando este medicamento.

#### **4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:**

Si ha presentado síntomas de alergia a cafeína, clorfenamina, ergotamina y / o metamizol sódico (dipirona).

Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes contenidos en la formulación.

Si padece de **porfiria hepática** o déficit congénito de glucosa-6-fosfato -dehidrogenasa.

#### **5.- Interacciones**

##### - Medicamentos

Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta. En este caso se han descrito las interacciones con los siguientes medicamentos: epinefrina, dihidroergotamina, clorpromazina, ciclosporina, fenilbutazona, warfarina, quinidina, alcohol, anticolinérgicos como atropina, butilescopolamina, antidepresivos tricíclicos como amitriptilina, clomipramina, antidepresivos como moclobemida, tranilcipromina, medicamentos que contengan alcohol, bepridil.

#### - Enfermedades

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el caso particular de este medicamento, si padece de **agarofobia**, ataques de pánico, **ulcera estomacal**, problemas para dormir, diarrea, dificultad para orinar, **hipertrofia prostática**, **glaucoma**, **hipertensión**, alguna infección, bloqueo intestinal, picazón severa, depresión, **hipertiroidismo**, bloqueo urinario, **asma**, **taquiarritmias**, **megacolon**, **agranulocitosis**.

#### - Alimentos

No se recomienda comer o tomar bebidas, en grandes cantidades, que contengan cafeína como bebidas cola, café, té, etc.

#### - Exámenes de laboratorio

Si se va a someter a algún examen médico, avísele a su médico a cargo que usted se encuentra en tratamiento con este medicamento, ya que cafeína puede alterar los resultados de algunos exámenes.

Metamizol sódico puede alterar los resultados de exámenes de **glucosa** en orina, por lo que debe avisar que se encuentra tomando este medicamento antes de practicarse el examen.

#### 6.- Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: ansiedad confusión severa, cambios en la visión, dolor de pecho, dolor en los brazos, piernas o en la parte inferior de la espalda, palidez, manos y pies azulados, ampollas rojas o violetas en la piel, las manos o los pies, convulsiones, diarrea, náuseas, vómitos, dolor de estómago, mareos, somnolencia o debilidad, fiebre, ulceraciones bucales, anales o genitales, fiebre, escalofríos, dolor de garganta, molestias para tragar, sudor frío, **vértigo**, náusea, pérdida del color de la piel, dificultad para respirar, inflamación de la cara, prurito, **taquicardia**, **hemorragias**, úlceras sangrantes en el recto, la boca y vagina.

#### - Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: diarrea, náusea y vómitos leves, mareos o somnolencia, nerviosismo, sequedad de boca, orina de color rojizo, pérdida de apetito, debilidad.

#### 7.- Sobredosis

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: latidos del corazón más rápidos o más lentos, diarrea, dolor de cabeza, dificultad para respirar, excitación, escalofríos, vértigo, náuseas, disminución en la frecuencia para orinar, somnolencia marcada, **pupilas** dilatadas, excitabilidad excesiva, confusión, pérdida de la coordinación, pérdida de conciencia.

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

**8.-Condiciones de almacenamiento:**

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

**No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico**

No recomiende este medicamento a otra persona.