

<b>Nombre:</b> Cafeína - Clorfenamina-Paracetamol <b>Condición de venta:</b> sin receta médica <b>Clasificación:</b> antigripal <b>Disponible en:</b>	<b>Nombres de marca:</b>
--	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

### 1.- ¿Para qué se usa?

Esta asociación de medicamentos es utilizada para el tratamiento sintomático de las molestias del resfrío común o de la gripe.

### 2.- Administración (oral)

#### - Rango y frecuencia

Se utiliza en asociaciones de 35mg de cafeína + 2 mg de clorfenamina y 500 mg de paracetamol. Una dosis cada 8 horas.

#### - Consejo de cómo administrarlo

Se aconseja tomarlo junto con las comidas y con un vaso de agua.

#### - Uso prolongado

No tome más de 7 días, si los síntomas persisten o empeoran debe consultar al médico, puede tener alguna complicación y necesitar otro medicamento.

### 3.- Precauciones

#### - Mayores de 60 años

Los ancianos son más sensibles a los efectos adversos de los medicamentos, por lo que debe consultar a su médico antes de tomar este medicamento.

#### - Consumo de alcohol

Debe evitar consumir alcohol mientras se encuentre en tratamiento con este medicamento, ya que este puede provocar un aumento de los efectos adversos del medicamento.

#### - Manejo de vehículos

Este medicamento puede causar en algunas personas mareos, somnolencia y / o disminuir sus capacidades mentales para reaccionar frente a **imprevistos**. Asegúrese del efecto que ejerce este medicamento sobre usted antes de manejar un vehículo o maquinaria peligrosa o realizar cualquier otra actividad riesgosa.

#### - Embarazo

Aunque el uso ocasional de este medicamento es poco probable que cause daño al feto, es preferible que usted consulte con el médico la conveniencia de usar este medicamento si está embarazada.

#### - Lactancia

Este medicamento pasa a la leche materna y puede afectar al lactante. Converse con su médico la conveniencia de usar este medicamento si está amamantando

#### - Lactantes y niños

Estos pacientes son más sensibles a los efectos adversos del medicamento, la administración debe ser previa consulta al pediatra, quién le señalará la dosis diaria a consumir.

#### - Precauciones especiales

Si después de unos días, sus síntomas no mejoran o empeoran debe consultar con su médico. Consulte a su médico antes de tomar este medicamento si es alérgico a algún medicamento, alimento, saborizante y / o edulcorante, o colorante.

Para prevenir problemas para dormir, no tome este medicamento después de las 18 horas o poco antes de ir a dormir.

Este medicamento puede causar sequedad de boca, la cual puede aliviarse chupando caramelos.

Antes de hacerse un examen de alergia a la piel debe avisarle al profesional de la salud a cargo que usted está tomando este medicamento.

#### 4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia a cafeína, clorfenamina y / o paracetamol.

Si ha presentado alergia a algún excipiente de la formulación.

#### 5.- Interacciones

##### - Medicamentos

Usted debe consultar con el farmacéutico la conveniencia de usar este medicamento, si está tomando otros, particularmente antidiabéticos, otros analgésicos, antihistamínicos, antitusivos, ácido ascórbico (vitamina C), y en general si se encuentra en tratamiento con cualquier otro medicamento, ya que el consumo de este antigripal puede alterar el efecto de otros medicamentos y causarle daño a su salud.

##### - Enfermedades

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa.

En el caso particular de este medicamento, si padece de **hipertensión arterial** u otra afección cardiovascular, cuadros ansiosos, **agorafobia**, ataques de pánico, insomnio, enfermedad renal, enfermedad hepática, **úlceras gastroduodenales** o historia de haberla presentado, alcoholismo.

##### - Exámenes de laboratorio

Si se va a someter a algún examen médico, avísele a su médico a cargo que usted se encuentra en tratamiento con este medicamento.

#### 6.- Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: ojos o piel amarilla, náuseas, vómitos, dificultad para respirar, sudoración, orina coloreada o turbia, manchas o prurito (picazón) o moretones en la piel, palidez o debilidad, dolor de la parte inferior de la espalda, disminución de la cantidad de orina, orina oscura o con sangre, hemorragias inusuales, deposiciones negras o con sangre, vértigos, taquicardia, irritabilidad, nerviosismo, insomnio, dificultad para hablar, náuseas, diarrea, vómitos, debe acudir de inmediato a su médico o al centro asistencial más cercano, llevando el envase del medicamento.

##### - Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: dificultad o dolor para orinar, mareos leves, náuseas o vómitos, dolor estomacal, nerviosismo, palidez, irritabilidad, sequedad de boca, somnolencia.

#### **7.- Sobredosis**

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: vómitos, náuseas, falta de apetito, dolor estomacal, somnolencia. Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

#### **8.-Condiciones de almacenamiento:**

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

#### **No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico**

No recomiende este medicamento a otra persona.