

## **CEFADROXILO ORAL 500 mg, 1g, 250 mg/5ml, 500 mg/5ml**

Lea cuidadosamente este inserto antes de la administración de este medicamento. Contiene información relevante acerca de su tratamiento. Si tiene alguna duda o no está seguro de algo, pregúntele a su médico o farmacéutico. Guarde este inserto, usted podría necesitar leerlo nuevamente. Verifique que este medicamento corresponda exactamente a aquel indicado por su médico.

### **Composición :**

Cada cápsula contiene: 500 mg de Cefadroxilo  
Cada comprimido contiene: 1 g de Cefadroxilo  
Cada 5 ml contiene: 250 mg y/o 500 mg de Cefadroxilo

Excipientes: Según lo aprobado en registro.

### **¿Qué es cefadroxilo?**

Cefadroxilo es un antibiótico usado para tratar una diversidad de infecciones bacterianas como las infecciones de la piel, urinarias, faringitis y/o tonsilitis causados por gérmenes sensibles demostrado por antibiograma. Los antibióticos no tienen ningún efecto sobre el resfrío, la gripe u otras infecciones causadas por los virus.

### **¿Cómo usar cefadroxilo?**

Tome este medicamento exactamente como lo indicó su médico.  
Siempre lea la información impresa en el inserto, si es posible, antes de comenzar el tratamiento.

Tome este medicamento a intervalos regulares y complete el ciclo prescrito. Es importante tomar el ciclo completo, aún si siente que la infección ha desaparecido, para prevenir que la infección reaparezca.

Nunca tome más de la dosis recetada, si usted sospecha que usted o alguien más ha tomado una sobredosis de cefadroxilo, contacte en seguida a su médico. Si es posible, siempre lleve el envase con usted, aún si está vacío.

Cefadroxilo es para usted, nunca se lo de a otro, aún si su enfermedad parece ser la misma que la suya.

Si está tomando la suspensión líquida, agítela vigorosamente antes de cada uso.

### **¿Qué precauciones especiales debo tener cuando estoy tomando cefadroxilo?**

Antes de tomar este medicamento asegúrese que su médico sepa:

Si usted está embarazada, tratando de tener un hijo o amamantando.

Si usted sufre de problemas renales o hepáticos, cardíacos o estomacales.

Si usted sufre de porfiria (una alteración sanguínea)

Si usted nunca ha tenido una reacción alérgica a este medicamento, o a otros antibióticos de cefalosporina como cefaclor o cefalexina, penicilina o cualquier otro medicamento.

Si usted está tomando cualquier otro medicamento, especialmente otros medicamentos anticoagulantes como warfarina, probenecid, vitaminas incluyendo aquellos disponibles para la venta sin receta, productos herbarios medicamentos complementarios.

Este medicamento puede provocar somnolencia. No conduzca automóviles ni maneje maquinaria pesada hasta que sepa como lo afectará este medicamento.

### **¿Puede cefadroxilo causar problemas?**

Junto con los efectos útiles, todos los medicamentos pueden causar síntomas no deseados. Estos generalmente mejoran a medida que el organismo se ajusta al nuevo medicamento. Dígame a su médico si alguno de los siguientes síntomas continúan o llegan a ser molestos.

Diarrea, dolor de estómago, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, sarpullido leve.

Importante: Si experimenta cualquiera de los siguientes síntomas suspenda la administración de cefadroxilo y contacte inmediatamente a su médico. Exantema cutáneo, picazón, ictericia (piel amarillenta y parte blanca de los ojos), fiebre (temperatura alta), dolor de las articulaciones, hinchazón de la lengua, garganta o cara, resoplo (silbido al respirar), hemorragia o moretones inusuales. Dolor en boca o lesiones en la garganta, infección vaginal.

Si usted experimenta cualquier otro síntoma preocupante, el cual usted cree que pueda ser debido a este medicamento, convérselo con su médico.

### **¿Quién no debiera tomar cefadroxilo?**

Los pacientes alérgicos a las cefalosporinas, penicilina o a cualquier excipiente de la fórmula.

### **¿Qué dieta especial debo seguir mientras tomo este medicamento?**

Se puede administrar cefadroxilo con o sin alimento. Si el medicamento le produce malestar estomacal considere que el tomarlo con alimentos ayuda a aliviar el problema.

### **¿Qué debo hacer si olvido tomar una dosis de cefadroxilo?**

Tomarla tan pronto como lo recuerde. Si es casi la hora de la próxima dosis y está tomando el medicamento una vez al día, tome la dosis perdida y la próxima 10 a 12 horas más tarde. Si está tomando 2 dosis por día, tome la dosis perdida y la próxima 5 a 6 horas más tarde. Si está tomando el medicamento 3 o más veces al día, tome la dosis perdida y la próxima 2 a 4 horas más tarde. Entonces regrese a su esquema regular.

### **¿Cuál es la dosis recomendada de cefadroxilo?**

El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiado a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es:

**Adultos:** Para el tratamiento de infecciones del tracto urinario sin complicaciones, la dosis usual es de 1 a 2 g diarios en una sola dosis o en 2 dosis iguales; para otras infecciones urinarias se usa 1 g 2 veces al día. Para tratar infecciones de la piel se usa 1 g en una sola dosis o dividida en 2 dosis iguales.

Para tratar faringitis y tonsilitis se usa 1g diario en una dosis o en dos dosis iguales por al menos 10 días.

**Niños:** Para tratar infecciones urinarias y de la piel en niños, se usa 30 mg/kg de peso diario dividido en dosis iguales cada 12 horas. Para tratar faringitis y tonsilitis, se usa 30 mg/kg peso diario en una sola dosis o dividida en 2 dosis iguales cada 12 horas por al menos 10 días.

### **¿Cómo preparo la Suspensión Oral?**

Agite o de un golpecito al frasco para soltar el polvo. Adicione la cantidad apropiada de agua hervida y fría. Invierta el frasco y agítelo bien.

El cefadroxilo reconstituído para suspensión oral es estable por 10 días a temperatura ambiente (almacenado en un lugar frío y seco) o 14 días cuando se almacena bajo refrigeración (2-8°C) Antes de utilizar agite el frasco. Guarde el frasco fuertemente cerrado. Deseche la porción no utilizada después de 10 días a

temperatura ambiente o 14 días refrigerada.

## **¿Qué debo hacer en caso de sobredosis o ingestión accidental con cefadroxilo?**

Cefadroxilo es generalmente seguro. Sin embargo, grandes cantidades pueden causar los efectos laterales enumerados anteriormente. Si usted sospecha de una sobredosis con cefadroxilo, solicite inmediatamente atención médica.

### **¿Cómo almaceno cefadroxilo?**

- Mantener fuera del alcance de los niños
- Mantener en un lugar frío y seco, lejos de la luz directa y el calor.
- Nunca guarde medicamentos vencidos o no deseados. Deséchelos prudentemente lejos del alcance de los niños o lleve al farmacéutico del barrio quien eliminará los medicamentos no deseados por usted.
- Guarde cerrado el envase de la solución oral en el refrigerador y deseche cualquier medicamento no utilizado después de 14 días de haber sido abierto.

### **¿Cuáles son las presentaciones de cefadroxilo?**

Según lo aprobado en registro.

Mantener fuera del alcance de los niños

No utilice este producto después de la fecha de expiración, indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin la indicación de su médico.

No recomiende este medicamento a otra persona.

**REVISADO EL 21 DE FEBRERO DEL 2007**