

Nombre: Clobutinol _ Cloruro de amonio - Orciprenalina

Condición de venta: con receta médica

Clasificación: antitusivo -broncodilatador

Disponible en:

Nombres de marca:

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

§ **Composición y presentación:**

§ **Principio Activo:**

§ **Excipientes:**

1.- ¿Para qué se usa?

Este medicamento está indicado como tratamiento sintomático de la tos productiva y no productiva o irritante, acompañada de broncoespasmo.

2.- Administración

- Rango y frecuencia

El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiados a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es:

Adultos: 10 mL. De jarabe (40 mg. de clobutinol clorhidrato, 10 mg. de orciprenalina sulfato y 70 mg de cloruro de amonio) cada 8 horas

Niños mayores de 2 años: 5 mL. De jarabe (20 mg. de clobutinol clorhidrato, 5 mg. De orciprenalina sulfato y 35 mg. de cloruro de amonio) cada 8 horas.

Lactantes menores de 2 años: 2,5 mL. De jarabe (10 mg. de clobutinol clorhidrato, 2,5 mg. de orciprenalina sulfato y 17,5 mg. de cloruro de amonio) cada 8 horas.

- Consejo de cómo administrarlo

Debe utilizar el medicamento según indique su médico, sin utilizar dosis mayores o con mayor frecuencia a la indicada por su médico.

- Uso prolongado

Si la tos continúa luego de unos días de tratamiento debe consultar nuevamente con su médico.

3.- Precauciones

- Consumo de alcohol

Debe evitar el consumo de alcohol durante el tratamiento con este medicamento, ya que acentúa los efectos adversos.

- Manejo de vehículos

Este medicamento puede causar en algunas personas mareos y / o disminuir sus capacidades mentales para reaccionar frente a **imprevistos**. Asegúrese del efecto que ejerce este medicamento sobre usted antes de manejar un vehículo o maquinaria peligrosa o realizar cualquier otra actividad riesgosa.

- Embarazo

Este medicamento puede causar daño al **feto**, no se debe usar durante el primer trimestre del embarazo, asegúrese de que su médico sepa que está embarazada o que planifica estarlo

- Lactancia

Este medicamento pasa a la leche materna y puede afectar al lactante. Con verse con su médico la conveniencia de seguir el tratamiento o dejar de amamantar.

- Lactantes y niños

No debe administrarse en niños menores de 1 año, la dosis debe ser establecida por su pediatra en base a los kilogramos de peso del niño.

- Precauciones especiales

Si padece de diabetes debe tener en cuenta que orciprenalina puede provocar un aumento de los niveles de azúcar en la sangre.

4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia a clobutinol, cloruro de amonio, orciprenalina.

Si ha presentado alergia a algún excipiente de la formulación.

Si se encuentra dentro del primer trimestre de embarazo.

5.- Interacciones

- Medicamentos

Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta. En este caso se han descrito las interacciones con los siguientes medicamentos: codeína, morfina, fluoxetina, penicilina, teofilina, alprazolam, zolpidem, clorfenamina, fenobarbital, propranolol, atenolol, ergotamina, digoxina, isocarboxazida, procarbazona, glibenclamida.

- Enfermedades

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa.

En el caso particular de este medicamento, si padece de **epilepsia** o antecedentes convulsivos, insuficiencia respiratoria, **hipertiroidismo**, **hipertensión**, **tirotoxicosis**, taquicardia, miocardiopatía hipertrófica obstructiva, falla cardíaca congestiva, enfermedad cardíaca isquémica, **diabetes mellitus**.

6.- Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: **erupción** cutánea, picazón de la piel, náuseas, vómitos, dificultad para respirar.

- Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: **somnolencia**, **insomnio**, mareos, temblor, dolor de cabeza y enrojecimiento de la cara.

7.- Sobredosis

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como:

miosis, mareos, vómitos, **vértigo**, agitación, excitación, **somnolencia**, temblores, convulsiones. Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la intoxicación y tratarla adecuadamente. Debe llevar el envase del medicamento que se ha tomado.

8.-Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a la temperatura señalada en el envase

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona.