

Nombre: Cloramfenicol ótico	Nombres de marca:
Condición de venta: con receta médica	
Clasificación: antibiótico	
Disponible en:	

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

1.- ¿Para qué se usa?

Este medicamento es utilizado en el tratamiento de infecciones causadas por bacteria sensibles en el canal auditivo.

Este medicamento exige diagnóstico y supervisión médica.

2.- Administración (ótico)

- Rango y frecuencia

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es de 2 a3 gotas de solución ótica en el oído afectado 3 veces al día.

Debe evitar olvidar alguna aplicación y respetar los horarios. Si no cumple el tratamiento lo más probable es que la enfermedad se vuelva a presentar con mayor intensidad y este medicamento ya no le servirá para detener la infección.

- Consejo de cómo administrarlo

Cuando se aplica en los oídos debe mantener la posición (recostado) por unos minutos o tapar el oído con un poco de algodón para evitar que el medicamento se derrame.

Debe evitar tocar con la punta del aplicador la zona infectada.

- Uso prolongado

No lo use por más o menos tiempo que el señalado por su médico.

3.- Precauciones

- Mayores de 60 años

No existe recomendación especial para los ancianos.

- Manejo de vehículos

Es poco probable que el medicamento afecte su capacidad de concentración y estado de alerta.

- Embarazo

Este medicamento se absorbe en cantidades mínimas, es poco probable que dañe al **feto**.

- Lactancia

Este medicamento no pasa a la leche materna.

- Lactantes y niños

Los niños son más sensibles a los efectos del medicamento, no se recomienda su uso en niños.

- **Precauciones especiales**

Si después de unos días, sus síntomas no mejoran o empeoran debe consultar con su médico.

4.- Usted no debe usar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia al medicamento.

Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.

5.- Interacciones

- **Medicamentos**

Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta. En este caso se han descrito las interacciones con los siguientes medicamentos: alfentanil, amfoterivcina B, azatioprima, drogas quimioterapéuticas para el tratamiento del cáncer, colchicina, clindamicina, ciclofosfamida, eritromicinas, glibenclamida, flucitocina, ganciclovir, interferon, mefenitoína, mercaptopurina, metotrxato, fenitoína, zidovudina.

- **Enfermedades**

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el caso particular de este medicamento, si padece de **anemia** u otros desordenes sanguíneos, o se encuentra en **terapia radioactiva**.

- **Exámenes de laboratorio**

Cloramfenicol puede provocar falsos resultados en los test de azúcar en sangre de diabéticos, por lo que si se va a someter a algún examen médico, avísele a su médico a cargo que usted se encuentra en tratamiento con este medicamento.

Debe avisar que se encuentra en tratamiento con cloramfenicol antes de realizarse una radiografía, ya que estas pueden aumentar el riesgo de tener **problemas sanguíneos**.

6.- Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: palidez de la piel, ampollas en garganta y fiebre, moretones o **hemorragias** inusuales, **fatiga** inusual, confusión, **delirio**, dolor de cabeza, escalofríos, desmayos, **rash** o irritación de la piel.

- **Otros efectos**

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: diarrea leve, náuseas leve.

7.- Sobredosis

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: náuseas, vómitos, diarrea, sabor desagradable en la boca. Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la intoxicación y tratarla adecuadamente. Debe llevar el envase del medicamento que se ha tomado.

8.- Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona.