

Nombre: Clorhexidina comprimidos Condición de venta: sin receta médica Clasificación: antiséptico bucofaríngeo Disponible en:	Nombres de marca:
--	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

1.- ¿Para qué se usa?

Es utilizado como coadyuvante en el tratamiento sintomático de las molestias producidas por infecciones bucofaríngeas.

2.- Administración (oral)

- Rango y frecuencia

Se utiliza un comprimido cada 3 o 4 horas. Máximo 8 comprimidos diarios.

- Consejo de cómo administrarlo

Debe dejar disolver el comprimido lentamente en la boca. Se debe evitar comer y beber durante algunas horas después de usar el medicamento.

- Uso prolongado

Si los síntomas persisten empeoran o aparece fiebre, después de un par de días de uso, debe acudir a la brevedad posible al médico. Puede estar desarrollando una enfermedad mas severa que requiera de otros medicamentos.

3.- Precauciones

- Embarazo

Debe consultar con su médico antes de utilizar este medicamento, si está embarazada.

- Lactancia

Debe consultar con su médico antes de utilizar este medicamento si está amamantando.

- Lactantes y niños

Los niños son mas sensibles a los efectos adversos de los medicamentos, la dosis debe ser señalada por su pediatra.

- Precauciones especiales

No debe enjuagarse la boca luego de tomar el medicamento.

4.- Usted no debe usar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia a clorhexidina.

Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.

5.- Interacciones

- Medicamentos

Usted debe consultar con el farmacéutico la conveniencia de usar este medicamento, si está tomando otros, particularmente blanqueadores dentales.

- Enfermedades

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa.

- **Alimentos**

No debe ingerir alimentos al menos un par de horas después de haber utilizado el medicamento.

6.- Efectos adversos

Pueden presentarse algunos efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: sensación de quemazón bucal, irritación, coloración de las superficies orales, alteraciones del gusto y descamación de la mucosa oral.

7.- Sobredosis

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente. Debe llevar el envase del medicamento que se ha tomado.

8.-Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona.