

Nombre: Clorhexidina - Nosacapina Condición de venta: sin receta médica Clasificación: antitusivo Disponible en:	Nombres de marca:
---	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

1.- ¿Para qué se usa?

Este medicamento es usado como coadyuvante en el tratamiento sintomático de las molestias producidas por infecciones bucofaríngeas, asociadas a tos irritativa no productiva.

2.- Administración (oral)

- **Rango y frecuencia**

Dosis adultos: 5 mg clorhexidina + 10 mg de noscapina cada 4 horas.

- **Consejo de cómo administrarlo**

Debe dejar disolver el comprimido lentamente en la boca. Se debe evitar comer y beber durante algunas horas después de usar el medicamento.

- **Uso prolongado**

Si los síntomas persisten empeoran o aparece fiebre, después de un par de días de uso, debe acudir a la brevedad posible al médico. Puede estar desarrollando una enfermedad mas severa que requiera de otros medicamentos. o debe usar este medicamento en forma prolongada o repetida sin consultar con su médico.

3.- Precauciones

- **Mayores de 60 años**

En pacientes ancianos se recomienda utilizar la mitad de la dosis o usarlo sólo bajo prescripción médica. Si se presentan síntomas como cansancio extremo o dificultad para respirar, debe dejar de tomar el medicamento.

- **Consumo de alcohol**

No debe consumir alcohol mientras se encuentre en tratamiento con este medicamento, ya que se intensifican los efectos adversos de noscapina.

- **Manejo de vehículos**

Este medicamento puede causar en algunas personas **somnolencia**, mareos y / o disminuir sus capacidades mentales para reaccionar frente a **imprevistos**. Asegúrese del efecto que ejerce este medicamento sobre usted antes de manejar un vehículo o maquinaria peligrosa o realizar cualquier otra actividad riesgosa.

- Embarazo

Este medicamento puede causar daño al **feto**, usted debe consultar al médico, antes de usar este medicamento si está embarazada.

- Lactancia

Este medicamento pasa a la leche materna y puede afectar al lactante. Converse con su médico la conveniencia de seguir el tratamiento o dejar de amamantar.

- Precauciones especiales

Este medicamento sólo alivia la tos asociada a irritaciones leves de garganta, debe consultar con su médico si observa aparición de flemas, fiebre por más de dos días, cansancio o dificultad para respirar, sudoración nocturna o cualquier otro síntoma distinto o exagerado respecto a un resfrío común.

4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia a nospapina Y / o clorhexidina.

Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.

En el caso que padezca de tos asmática o insuficiencia respiratoria (caracterizada por cansancio extremo o inusual).

5.- Interacciones

- Medicamentos

Usted debe consultar con el farmacéutico la conveniencia de usar este medicamento, si está tomando otros, particularmente diazepam, alprazolam, fenobarbital, morfina.

- Enfermedades

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el caso particular de este medicamento, si padece de **glaucoma**, **asma**, retención urinaria o cualquier enfermedad relacionada con el sistema respiratorio.

- Alimentos

No debe ingerir alimentos al menos un par de horas después de haber utilizado el medicamento.

6.- Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: **broncoconstricción**, **hipotensión** transitoria, **constipación**, mareos, náuseas, vómitos.

- Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: ligera **somnolencia**, mareos, dolores de cabeza, náuseas, manchas en los dientes.

7.- Sobredosis

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: dificultad respiratoria, mareos, náuseas, **desvanecimientos**. Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la intoxicación y tratarla adecuadamente. Debe llevar el envase del medicamento que se ha tomado.

8. -Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona.