

CONDROITINA SULFATO/GLUCOSAMINA SULFATO POLVO PARA SOLUCION ORAL, EN SOBRES

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto, puede necesitar leerlo nuevamente. Verifique que este medicamento corresponda exactamente al indicado por su médico.

COMPOSICION:

Cada sobre con polvo para solución oral contiene:

Condroitina sulfato 1200 mg

Glucosamina sulfato 1500 mg

(como glucosamina sulfato sódica)

Excipientes . Según lo aprobado en Registro.

VIA DE ADMINISTRACION:

Oral

CLASIFICACION:

Antiartrósico

RECOMENDACIONES DE USO:

Coadyuvante en el tratamiento de la artrosis leve a moderada.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

Antes de usar este medicamento debe sopesarse los riesgos y beneficios en su uso, los que deben ser discutidos entre Ud. y su médico. Principalmente debe considerar los aspectos siguientes:

a) Alergias: Usted debe comunicar a su médico si alguna vez ha presentado alguna reacción alérgica a este medicamento o a alguna otra sustancia, ya sea alimentos, preservantes, colorantes, saborizantes u otros medicamentos.

b) Embarazo: Ud. debe comunicar a su médico si está embarazada o planea estarlo. No se recomienda su uso en mujeres embarazadas.

c) Lactancia: Se recomienda que las mujeres que toman este medicamento no amamenten. Id. Debe conversar acerca de la conveniencia del uso de este producto mientras está amamantando.

d) Antes de comenzar el tratamiento con este medicamento Ud. debe informar a su médico si presenta problemas cardiacos, insuficiencia renal o hepática o alteraciones de la coagulación y si esta en tratamiento con anticoagulantes.

e) En algunas personas el uso de este medicamento puede causar somnolencia.

CONTRAINDICACIONES

Este medicamento no debe ser usado en pacientes que presenten algunas de las siguientes afecciones, excepto si su médico lo indica:

- Pacientes con antecedentes de alergia a alguno de los componentes de la formulación.
- Pacientes con insuficiencia renal severa.

INTERACCIONES

El efecto de un medicamento puede modificarse por su administración junto con otros (interacciones). Ud. debe comunicar a su médico de todos los medicamentos que está tomando ya sea con o sin receta médica antes de usar este fármaco, especialmente si se trata de: medicamentos anticoagulantes, hipoglicemiantes, quitosano. También debe tenerse precaución en caso de utilizar tetraciclinas, cloranfenicol o analgésicos antiinflamatorios no esteroideos.

EFFECTOS ADVERSOS (no deseados):

Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se pretende obtener.

Consulte inmediatamente a su médico si presenta algún tipo de reacción alérgica al medicamento.

Pueden ocurrir otros efectos no deseados que usualmente no requieren atención médica y que desaparecen con el uso, como son la presencia de náuseas, diarrea y dolor estomacal. No obstante, si continúan o se intensifican debe comunicarlo a su médico:

Si Ud. nota cualquier otro efecto molesto no mencionado consulte con el médico.

FORMA DE ADMINISTRACION Y DOSIS:

El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiado a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es:

1 sobre por día, disolviendo el contenido de este en medio vaso de agua hervida o purificada.

El sulfato de glucosamina es una droga de acción lenta, por tanto, su efecto terapéutico empieza a manifestarse entre 8 y 12 semanas después de iniciado el tratamiento.

PRESENTACION:

Según lo aprobado en Registro.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original.

Según lo aprobado en Registro.

NO USAR ESTE PRODUCTO DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO INDICADA EN EL ENVASE.

NO RECOMIENDE ESTE MEDICAMENTO A OTRA PERSONA.

**Elaborado y distribuido por
Laboratorios Andr maco S.A.
Avda, Quilin 5273, Pe alolen, Santiago**