

Nombre: Ciclobenzaprina Condición de venta: con receta médica Clasificación: relajante muscular Disponible en:	Nombres de marca:
---	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

1.- ¿Para qué se usa?

Este medicamento es utilizado para el alivio de espasmos musculares asociado a condiciones agudas dolorosas músculo esqueléticas.

2.- Administración (oral)

- Rango y frecuencia

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es: 10 mg. tres veces al día, la dosis máxima diaria recomendada es de 60 mg. al día.

- Consejo de cómo administrarlo

Lo puede tomar antes, durante o después de las comidas sin problemas; debe tomar el medicamento acompañado con un vaso de agua.

- Uso prolongado

En general se recomienda que utilice el medicamento por periodos cortos a menos que su médico indique lo contrario.

3.- Precauciones

- Mayores de 60 años

Los ancianos deberán recibir una especial vigilancia durante el tratamiento con ciclobenzaprina, ya que en ellos los efectos adversos se pueden ver acentuados.

- Consumo de alcohol

Debe evitar el consumo de alcohol mientras se encuentre en tratamiento con este medicamento, ya que este acentúa los efectos adversos de ciclobenzaprina.

- Manejo de vehículos

Este medicamento puede causar en algunas personas mareos y / o disminuir sus capacidades mentales para reaccionar frente a **imprevistos**. Asegúrese del efecto que ejerce este medicamento sobre usted antes de manejar un vehículo o maquinaria peligrosa o realizar cualquier otra actividad riesgosa.

- Embarazo

Este medicamento puede causar daño al **feto**, usted debe consultar al médico, antes de usar este medicamento si está embarazada.

- **Lactancia**

Se desconoce si el medicamento pasa a la leche materna. Debe consultar al médico antes de usar este medicamento si está amamantando.

- **Lactantes y niños**

No se recomienda el uso de ciclobenzaprina en menores de 15 años, a menos que su médico lo indique.

- **Precauciones especiales**

La suspensión del tratamiento debe realizarla poco a poco, según las indicaciones de su médico, ya que de lo contrario podría presentar malestar general, dolor de cabeza y náuseas.

Este medicamento puede causar sequedad de boca, la cual puede aliviarse chupando caramelos.

Si ha estado o está en tratamiento con antidepresivos como tranilcipromina, moclobemida; deberá esperar al menos 14 días antes de iniciar el tratamiento con ciclobenzaprina.

Este medicamento puede necesitar un ajuste de dosis en pacientes que tienen deterioro hepático severo, consulte con su médico si usted padece de algún tipo de daño al hígado.

4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia a ciclobenzaprina.

Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.

5.- Interacciones

- **Medicamentos**

Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta. En este caso se han descrito las interacciones con los siguientes medicamentos: guanetidina, imipramina, nortriptilina, sertralina, fluoxetina, clorpromazina, tioridazina, clorfenamina, clemastina, fenobarbital, tranilcipromina, moclobemida.

- **Enfermedades**

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al **hígado**, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el caso particular de este medicamento, si padece de **arritmias**, **hipertiroidismo**, o ha sufrido un **infarto al miocardio** recientemente, glaucoma, problemas para orinar.

6.- Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: retención de orina, confusión, dolor muscular, temblor, **alucinaciones**, depresión, dificultad para respirar, **taquicardia**.

- **Otros efectos**

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: **somnolencia**, sequedad de boca, mareos, debilidad, **fatiga**, hormigueos, mal sabor de boca, visión borrosa, **insomnio**, dolor de cabeza, **estreñimiento**.

7.- Sobredosis

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: **convulsiones**, **somnolencia** severa, desmayos o latidos cardiacos rápidos o irregulares, respiración dificultosa, **alucinaciones**, aumento o disminución de la temperatura corporal, rigidez muscular inexplicable, nerviosismo, vómitos. Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la intoxicación y tratarla adecuadamente. Debe llevar el envase del medicamento que se ha tomado.

8. -Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona.