

Nombre: Clonazepam Condición de venta: con receta médica retenida Clasificación: ansiolítico Disponible en:	Nombres de marca:
--	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

1.- ¿Para qué se usa?

- Este medicamento está indicado en el tratamiento de la ausencias típica (petit mal), ausencia atípica, convulsiones mio clónicas y convulsiones atónicas.
- También está indicado en el tratamiento de las convulsiones tónico clónicas (gran mal), convulsiones parciales simples, parciales completas y convulsiones generalizadas tónico-secundarias.
- Otro uso de este medicamento es para el tratamiento de las crisis de pánico.

2.- Administración (oral)

- Rango y frecuencia

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es:

En el caso de adultos:

En las **enfermedades epilépticas** iniciar el tratamiento con una dosis de 0.5 mg. 3 veces al día, aumentando la dosis en 0.5 a 1.0 mg. cada 3 días hasta que las crisis convulsivas estén controladas o hasta que los efectos adversos impidan seguir aumentando la dosis. La dosis máxima es de 20 mg. diarios.

Para el tratamiento de las **crisis de pánico** se inicia la terapia con 0.25 mg.2 veces al día, aumentando la dosis a 1 mg./día luego de tres días de tratamiento. La dosis máxima recomendada es de 4 mg./día.

En el caso de niños entre 10-16 años:

La dosis inicial para el tratamiento de las convulsiones suele ser 1 - 1.5 mg. en 2 o 3 tomas diarias, esta dosis puede aumentarse en intervalos de 0.25 - 0.5 mg. cada 72 horas hasta llegar a la dosis de mantención que suele estar entre los 3 - 6 mg./día.

Para niños hasta 10 años o 30 Kg.:

La dosis inicial para el tratamiento de las convulsiones es 0.01 - 0.03 mg./kg./día repartidos en 2 o 3 dosis, sin exceder los 0.5 mg/kg/día, esta dosis puede ser aumentada en no más de 0.25 - 0.5 mg. cada tres días, hasta alcanzar la dosis de mantención que suele estar en el rango de 0.1 - 0.2 mg/kg/día.

- **Consejo de cómo administrarlo**

Se recomienda que tome el medicamento junto a las comidas para evitar problemas estomacales.

- **Uso prolongado**

Usted debe tomarlo solamente por el periodo de tiempo señalado por su médico. El uso prolongado de este medicamento causa **dependencia**, la suspensión del medicamento no debe ser brusca, ya que puede producir un **síndrome de abstinencia** caracterizado por **ansiedad**, agitación, temblores, **insomnio**.

3. - Precauciones

- **Mayores de 60 años**

Los ancianos son más sensibles a los efectos adversos de los medicamentos, por lo que debe tener especial precaución si se encuentra en tratamiento con clonazepam.

- **Consumo de alcohol**

Evite el consumo de alcohol mientras está en tratamiento con este medicamento, ya que se aumentan los riesgos de efectos adversos, principalmente a nivel del **sistema nervioso central** (dificultad para concentrarse, depresión y otros).

- **Manejo de vehículos**

Este medicamento disminuye su estado de alerta y su capacidad de reaccionar frente a imprevisto, por lo tanto evite manejar vehículos, maquinaria peligrosa o realizar cualquier otra actividad de riesgo mientras se encuentre en tratamiento con este medicamento.

- **Embarazo**

Este medicamento puede causar daño al **feto**, usted debe consultar al médico, antes de usar este medicamento si está embarazada.

- **Lactancia**

Este medicamento pasa a la leche materna y puede afectar al lactante. Converse con su médico la conveniencia de seguir el tratamiento o si debe dejar de amamantar.

- **Lactantes y niños**

Los niños son más sensibles a los efectos adversos del medicamento. El uso de clonazepam en niños es posible solo en las condiciones determinadas por su pediatra.

- **Precauciones especiales**

No debe interrumpir bruscamente el tratamiento, su médico le debe indicar la forma en que debe ir reduciendo la dosis a tomar.

Se puede producir olvido de acontecimientos recientes por efecto de este medicamento.

Nunca se deben tomar dosis mayores que las recomendadas por su médico.

No consuma alcohol mientras está en tratamiento con clonazepam.

Consulta con su médico antes de consumir medicamentos que le provoquen sueño, como medicamentos para la alergia o resfriado, tranquilizantes, etc.

4. - Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia a clonazepam u otra **benzodiazepina**.

Si ha presentado alergia a algún excipiente de la formulación.

5. - Interacciones

- **Medicamentos**

Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta. En este caso se han descrito las interacciones con los siguientes medicamentos: clorfenamina, fluoxetina, fenobarbital, seudoefedrina, fenilefrina, medicamentos para el resfrío.

- Enfermedades

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el caso particular de este medicamento, si padece de alcoholismo, alguna enfermedad pulmonar crónica, glaucoma, depresión u otra enfermedad mental, **miastenia gravis**, **apnea de sueño**, **porfiria**.

- Exámenes de laboratorio

Si se va a someter a algún examen médico, avísele a su médico a cargo que usted se encuentra en tratamiento con este medicamento.

6.- Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: dificultad para concentrarse, depresión alucinaciones, **hipotensión**, debilidad muscular, **rash** o picazón, sequedad de garganta, fiebre y escalofríos, ampollas o **ulceras** en la garganta o boca, moretones inusuales o **hemorragias**, fatiga extrema, tinte amarillo en ojos y piel.

- Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: mareos, pérdida de la coordinación, cambios en el deseo o actividad sexual, **constipación**, náuseas.

7.- Sobredosis

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: sueño excesivo, confusión, dificultad para hablar, baja respuesta de los reflejos, pobre coordinación, dificultad para respirar, pérdida de conciencia. Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

8.-Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30 °C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico
No recomiende este medicamento a otra persona.