

<b>Nombre:</b> Colchicina** <b>Condición de venta:</b> con receta médica <b>Clasificación:</b> antigotoso <b>Disponible en:</b>	<b>Nombres de marca:</b>
--	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

### 1.- ¿Para qué se usa?

Este medicamento es utilizado para el alivio de los ataques agudos de gota y para la profilaxis de su recurrencia.

### 2.- Administración (oral)

#### - Rango y frecuencia

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es:

- Ataque agudo de gota: Iniciar la terapia con 1 mg. Para luego seguir con 0.5 mg cada hora hasta el alivio de los síntomas o hasta que aparezcan molestias estomacales.
- Profilaxis de ataques de gota: 0.5 mg. Al día , la frecuencia del tratamiento y su duración dependerá de la severidad y frecuencia de los ataques de gota.

#### - Consejo de cómo administrarlo

Este medicamento se puede tomar con o sin comida.

Tome este medicamento tal como su médico le ha indicado, no lo deje de tomar ni tome más de lo ordenado por su médico aún cuando sienta que los síntomas no desaparecen.

#### - Uso prolongado

Debe usarlo durante el tiempo que su médico se lo señale, respetando los horarios y las dosis.

### 3.- Precauciones

#### - Mayores de 60 años

Los ancianos son más sensibles a los efectos adversos de los medicamentos, por lo que debe seguir las indicaciones de su médico durante el tratamiento con colchicina.

#### - Consumo de alcohol

Evite el consumo de alcohol mientras está en tratamiento con este medicamento, ya que se aumentan los riesgos de efectos adversos de colchicina.

#### - Manejo de vehículos

Asegúrese del efecto que tiene sobre usted este medicamento, antes de manejar un vehículo o maquinaria peligrosa.

#### - Embarazo

Este medicamento puede causar daño al **feto**, usted debe consultar al médico, antes de usar este medicamento si está embarazada.

#### - Lactancia

Este medicamento pasa a la leche materna, por lo que debe discutir con su médico la conveniencia de usar este medicamento o de suprimir la lactancia.

#### - Lactantes y niños

El uso de este medicamento en niños debe ser previa consulta a su pediatra.

#### - Precauciones especiales

Si después de unos días, sus síntomas no mejoran o empeoran debe consultar con su médico.

Este medicamento puede necesitar ajuste de dosis si usted padece de insuficiencia renal o hepática, informe a su médico si ello ocurre.

#### **4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:**

Si ha presentado síntomas de alergia a colchicina.

Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.

#### **5.- Interacciones**

##### - Medicamentos

Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta. En este caso se han descrito las interacciones con los siguientes medicamentos: amfotericina B, azatipoprina, cloramfenicol, ciclofosfamida, flucitocina, ganciclovir, mercaptopurina, metotrexato, fenilbutazona, zidovudina, vitamina B12 y otras vitaminas

##### - Enfermedades

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el caso particular de este medicamento, si padece de **ulcera** estomacal, alguna enfermedad intestinal como mala absorción, **colitis**, bajo recuento de células sanguíneas.

##### - Alimentos

Se debe evitar consumir alimentos como sardinas, legumbres, hígado, riñones, pollo, pan dulce, para prevenir ataques de gota.

##### - Exámenes de laboratorio

Si se va a someter a algún examen médico, avísele a su médico a cargo que usted se encuentra en tratamiento con este medicamento.

#### **6.- Efectos adversos**

**Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico:** diarrea, náuseas, vómitos, dolor de estómago, heces negras, sangre en la orina o en heces, dificultad para respirar al hacer ejercicio, fiebre con o sin escalofríos, dolor de cabeza, inflamación de la cara, ojos, boca, labios y / o lengua, manchas rojas en la piel, mareos, moretones inusuales.

##### - Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: pérdida del apetito, pérdida de cabello.

### **7. - Sobredosis**

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: sensación de ardor del estómago, de la garganta o de la piel, diarrea severa, náuseas, dolor de estómago, vómitos severos.

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

### **8. -Condiciones de almacenamiento:**

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor, luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

### **No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico**

No recomiende este medicamento a otra persona.