

Nombre: Crotamiton Condición de venta: sin receta médica de uso tópico Clasificación: pediculicida Disponible en:	Nombres de marca:
--	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

.- ¿Para qué se usa?

Para el tratamiento de escabiosis (sarna), pediculosis (piojos) y para el tratamiento del prurito asociado a dermatosis.

2.- Administración (tópica)

- **Rango y frecuencia**

Para el tratamiento de escabiosis: se aplica una vez al día durante 5 días.

Para el tratamiento de pediculosis: basta con una aplicación.

- **Consejo de cómo administrarlo**

Para el tratamiento de escabiosis se recomienda que aplique la crema con un masaje en todo el cuerpo desde el mentón hasta los pies, especialmente en los pliegues; no debe retirar el medicamento una vez aplicado y no debe bañarse durante el periodo de tratamiento para hacer más efectiva la acción de crotamiton. Debe practicar un baño de limpieza 48 horas después de la última aplicación.

Para el tratamiento de la pediculosis debe aplicar después de lavar el cabello, sobre el cuero cabelludo y debe mantener el medicamento 24 horas, luego debe lavar el cabello y peinar con un peine fino todos los días (se recomienda impregnar el peine en ácido acético al 5%).

La aplicación se puede repetir luego de 8 días.

- **Uso prolongado**

No lo use por más tiempo o mayor frecuencia que lo recomendado.

3.- Precauciones

- **Mayores de 60 años**

No existe recomendación especial para los ancianos.

- **Manejo de vehículos**

Es poco probable que el medicamento afecte su capacidad de concentración y estado de alerta.

- **Embarazo**

Este medicamento puede causar daño al feto, debe consultar con su médico antes de utilizar este medicamento si se encuentra embarazada.

- **Lactancia**

No se ha observado que el uso de este medicamento durante la lactancia cause daño en el niño, pero es preferible que consulte con su médico antes de aplicárselo si está embarazada.

- **Lactantes y niños**

El uso de este medicamento en niños debe ser previa consulta a su pediatra.

- **Precauciones especiales**

Si después de unos días, sus síntomas no mejoran o empeoran debe consultar con su médico.

Debe evitar aplicar este medicamento en la boca o tragarlo.

No debe aplicar este medicamento en los ojos u otras membranas como dentro de la nariz, ya que crotamiton puede causar irritación. Si esto sucede debe lavar con abundante agua.

No debe aplicar el medicamento en heridas abiertas o piel muy raspada.

4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia a crotamiton.

Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.

5.- Interacciones

- **Medicamentos**

Usted debe consultar con el farmacéutico la conveniencia de usar este medicamento, si está utilizando otros, aunque al aplicarlo sobre la piel el riesgo de interacciones es bajo.

- **Enfermedades**

Usted debe consultar con farmacéutico la conveniencia de usar este medicamento, si padece de alguna inflamación severa de la piel.

6.- Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: irritación de la piel, rash, reacciones de hipersensibilidad (alergia), tales como ronchas en la piel, hinchazón, dificultad para respirar.

- **Otros efectos**

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: irritación local, sensación de quemaduras, picazón.

7.- Sobredosis

Si se aplica sobre heridas, áreas extensas de la piel o si se aplica con vendaje, existe la posibilidad de una mayor absorción y aparición de efectos adversos. Lavar con abundante agua.

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la intoxicación y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

8. -Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C. La una vez reconstituída la suspensión debe mantenerse refrigerada a menos de 5° C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona.