

Nombre: Decametrina Condición de venta: sin receta médica de uso tópico Clasificación: pediculicida Disponible en:	Nombres de marca:
---	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

1.- ¿Para qué se usa?

Para el tratamiento de escabiosis (sarna) y pediculosis (piojos) .

2.- Administración (tópica)

- Rango y frecuencia

Para el tratamiento de escabiosis: se aplica 1 vez al día durante 3 días.

Para el tratamiento de pediculosis: se aplica 1 vez al día por dos días.

- Consejo de cómo administrarlo

Para el tratamiento de escabiosis se recomienda que aplique con un masaje en todo el cuerpo desde el mentón hasta los pies, especialmente en los pliegues. Si se aplica en la noche puede bañarse al día siguiente, debe realizarlo durante 3 días seguidos. Se recomienda una aplicación más una semana después de terminado el tratamiento.

Para el tratamiento de la pediculosis se recomienda aplicar antes de ir a dormir, debe lavar el cabello y luego aplicar el medicamento sobre el cuero cabelludo, puede poner una toalla alrededor del cabello y dejar así durante 12 horas, luego debe lavar el cabello y peinar con un peine fino. Debe repetir la aplicación una vez más, siguiendo las mismas indicaciones.

- Uso prolongado

No lo use por más tiempo o mayor frecuencia que lo recomendado.

3.- Precauciones

- Mayores de 60 años

No existe recomendación especial para los ancianos.

- Manejo de vehículos

Es poco probable que el medicamento afecte su capacidad de concentración y estado de alerta.

- Embarazo

Este medicamento puede causar daño al feto, debe consultar con su médico antes de utilizar este medicamento si se encuentra embarazada.

- Lactancia

No se ha observado que el uso de este medicamento durante la lactancia cause daño en el niño, no obstante es preferible que consulte con su médico antes de aplicárselo

- **Lactantes y niños**

El uso de este medicamento en niños debe ser previa consulta a su pediatra.

- **Precauciones especiales**

Si después de unos días, sus síntomas no mejoran o empeoran debe consultar con su médico.

Debe evitar aplicar este medicamento en la boca o tragarlo.

No debe aplicar este medicamento en los ojos u otras membranas como dentro de la nariz, ya que decametrina puede causar irritación. Si esto sucede debe lavar con abundante agua.

4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia a decametrina o permetrina..

Si ha presentado alergia a algún excipiente de la formulación.

5.- Interacciones

- **Medicamentos**

Usted debe consultar con el farmacéutico la conveniencia de usar este medicamento, si está utilizando otros, aunque al aplicarlo sobre la piel el riesgo de interacciones es bajo.

- **Enfermedades**

Usted debe consultar con farmacéutico la conveniencia de usar este medicamento, si padece de alguna inflamación severa de la piel.

6.- Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: irritación de la piel, rash, reacciones de hipersensibilidad (alergia), tales como ronchas en la piel, hinchazón, dificultad para respirar.

- **Otros efectos**

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: irritación local, sensación de quemaduras, picazón.

7.- Sobredosis

Si se aplica sobre heridas, áreas extensas de la piel o si se aplica con vendaje, existe la posibilidad de una mayor absorción y aparición de efectos adversos.

Lavar con abundante agua.

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la intoxicación y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

8.-Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C. La una vez reconstituída la suspensión debe mantenerse refrigerada a menos de 5° C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico
No recomiende este medicamento a otra persona.