

Nombre: Domperidona Condición de venta: sin receta médica Clasificación: antiemético Disponible en:	Nombres de marca:
--	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

1.- ¿Para qué se usa?

Este medicamento está indicado en el tratamiento sintomático de náuseas y vómitos en los siguientes casos: reflujo gastroesofágico después de las comidas, dispepsia por dificultad del vaciamiento gástrico, vómitos en estados infecciosos, uso en pediatría en regurgitación post-prandial, estudios radiológicos o endoscópicos y afecciones hepatodigestivas.

2.- Administración (oral)

- Rango y frecuencia

La dosis usualmente recomendada para adultos en el manejo de náuseas y vómitos en adultos es de 20 mg. cada 8 horas.

La dosis pediátrica para 200 -400 microgramos/Kg. De peso cada 4 a 8 horas.

- Consejo de cómo administrarlo

Debe tomarlo 15 a 20 minutos antes de las comidas.

- Uso prolongado

Si los síntomas persisten luego de 5 días debe consultar con su médico, ya que domperidona puede estar ocultando una enfermedad más grave.

3.- Precauciones

- Consumo de alcohol

Debe evitar el consumo de alcohol durante el tratamiento con este medicamento, ya que el alcohol puede empeorar los síntomas de su enfermedad.

- Manejo de vehículos

Este medicamento puede causar en algunas personas **somnolencia**, mareos y / o disminuir sus capacidades mentales y reflejos para reaccionar frente a **imprevistos**. Asegúrese del efecto que ejerce este medicamento sobre usted antes de manejar un vehículo o maquinaria peligrosa o realizar cualquier otra actividad riesgosa.

- Embarazo

Este medicamento puede causar daño al **feto**, usted debe consultar al médico, antes de usar este medicamento si está embarazada.

- Lactancia

Debe consultar al médico antes de usar este medicamento si está amamantando.

- Lactantes y niños

La dosis en niños menores de 7 años debe ser indicada por su pediatra.

- Precauciones especiales

Se pueden producir síntomas de sobredosis con dosis normales sobre todo en niños y adolescentes y también con dosis altas como las empleadas en la prevención y tratamiento de vómitos inducidos por quimioterapia.

4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia al medicamento.

Si ha presentado alergia a algún excipiente de la formulación.

En el caso de que padezca de **hemorragia** digestiva, perforación u obstrucción intestinal o **feocromocitoma**.

5.- Interacciones

- Medicamentos

Usted debe consultar con el farmacéutico la conveniencia de usar este medicamento, si está tomando otros, particularmente sales de litio, analgésicos, clorfenamina, alprazolam, digoxina, levodopa, antiácidos, **antiespasmódicos**, **espasmodolíticos**.

- Enfermedades

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa.

En el caso particular de este medicamento, si padece de **asma**, **hemorragia** abdominal, **enfermedad de Parkinson**, **epilepsia**, **porfiria**, obstrucción intestinal, **feocromocitoma**.

6.- Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: **rush**, **urticaria**, calambres abdominales dificultad para hablar o tragar, mareos, latidos cardiacos irregular o rápido, fiebre, debilidad, **hipertensión**, temblor, movimientos incontrolados de brazos y piernas.

- Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: **diarrea**, **somnolencia**, **estreñimiento**, irritabilidad.

7.- Sobredosis

Se pueden presentar síntomas como **somnolencia**, temblor, **hipertensión**, mareos. Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la intoxicación y tratarla adecuadamente. Debe llevar el envase del medicamento que se ha tomado.

8.-Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona