

Nombre: Celecoxib Condición de venta: con receta médica Clasificación: analgésico Disponible en:	Nombres de marca:
---	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

1.- ¿Para qué se usa?

Este medicamento está indicado para el alivio de los signos, síntomas de inflamación y dolor en **osteoartritis**, **artritis reumatoídea** en el adulto.

Manejo del dolor luego de una **cirugía dental**. Dolor agudo, dismenorrea primaria.

Para reducir el número de **pólipos colorrectales adenomatosos** en la poliposis adenomatosa familiar, como auxiliar a los cuidados usuales (por ejemplo vigilancia endoscópica, cirugía)

2.- Administración (oral)

- Rango y frecuencia

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es:

- Manejo del dolor en pacientes que presentan **osteoartritis**: 200mg. en 1 o 2 tomas diarias.
- En el caso de pacientes con **artritis reumatoidea**: 100 o 200 mg. 2 veces al día.
- Para el manejo del **dolor agudo** y tratamiento de la **dismenorrea** primaria: 400 mg. iniciales seguidos de 200 mg. si es necesario durante el primer día, en los días subsiguientes se recomienda una dosis de 200 mg. dos veces al día según necesidad .
- Para la **poliposis adenomatosa primaria**: 400 mg. 2 veces al día.

Consejo de cómo administrarlo

Se recomienda consumir este medicamento con las comidas para mejorar su absorción.

- Uso prolongado

Debe usarlo durante el tiempo que su médico se lo señale, respetando los horarios y las dosis.

No consuma más medicamento ni con más frecuencia que el indicado por su médico.

3.- Precauciones

- Mayores de 60 años

No existe recomendación especial para los ancianos., pero pueden ser mas sensibles a los efectos adversos de este medicamento

- Manejo de vehículos

Asegúrese del efecto que tiene sobre usted este medicamento, antes de manejar un vehículo o maquinaria peligrosa.

- Embarazo

Este medicamento puede causar daño en el **feto**, no debe ser utilizado durante el último trimestre de embarazo. Debe asegurarse que su médico sabe que usted está embarazada

- Lactancia

Se desconoce si este medicamento pasa a la leche materna, si esto ocurriera podría afectar al lactante, por lo que debe conversar con su médico la conveniencia de seguir el tratamiento o dejar de amamantar.

- Lactantes y niños

Este medicamento no debe ser utilizado en menores de 18 años, ya que su seguridad no ha sido estudiada en niños.

- Precauciones especiales

Comuníquese a su médico si ha presentado alergia a otros antiinflamatorios o analgésicos. salicilatos, sulfonamidas, alimentos, colorantes, preservantes

Antes de realizarse una cirugía (incluso dental) o tratamiento de emergencia debe avisar al médico que se encuentra en tratamiento con este medicamento.

El uso de este medicamento se ha asociado con efectos cardiovasculares severos, por lo que si usted está en tratamiento y tiene o ha tenido alguna enfermedad al corazón (como angina de pecho, infarto al miocardio, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca) o infarto cerebral debe ponerse en contacto con su médico, tan pronto como sea posible, para que éste proceda a la sustitución del medicamento.

Debe comunicar a su médico si sufre o ha sufrido problemas de sangramiento o úlceras estomacales

4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia a Celecoxib u otro antiinflamatorio como el ácido acetilsalicílico (aspirina).

Si ha presentado alergia a algún excipiente de la formulación.

No debe usarse este medicamento en el período postoperatorio inmediato a una cirugía de by-pass coronario

5.- Interacciones

- Medicamentos

Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta. En este caso se han descrito las interacciones con los siguientes medicamentos: warfarina, teofilina, amitriptilina, tacrina, zileuton, rifampicina, enalapril, captopril, lisinopril, sales de litio, ácido acetilsalicílico (aspirina), fluconazol, furosemida.

- Enfermedades

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el caso particular de este medicamento, si padece de **deshidratación, edema, ulcera gastrointestinal, asma, urticaria, rinitis, anemia.**

- Exámenes de laboratorio

Si se va a someter a algún examen médico, avísele a su médico a cargo que usted se encuentra en tratamiento con este medicamento.

6.- Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: **edema** de extremidades inferiores, **hipertensión, pirosis, dispepsia**, náusea, diarrea, **vértigo**, fatiga, **sinusitis, bronquitis** e

infecciones del tracto urinario, **gastroenteritis**, **hemorragia** o **ulceración gastrointestinal**, síntomas de tipo gripal (escalofríos, fiebre, dolores musculares) **erupción** de la piel, aumento de peso inusual, **urticaria**, vómitos, visión borrosa.

- **Otros efectos**

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: **estreñimiento**, molestia epigástrica, dolor de espalda, somnolencia.

7. - Sobredosis

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

8. -Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona.