

**Nombre:** Enalapril -

Hidroclorotiazida

**Condición de venta:** con receta  
médica

**Clasificación:** hipotensor

**Disponible en:**

**Nombres de marca:**

**Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente**

**- Composición y presentación:**

**- Principio Activo:**

**- Excipientes:**

### **1.- ¿Para qué se usa?**

Enalapril es un **inhibidor** de la **enzima convertidora de angiotensina**, hidroclorotiazida es un diurético (aumenta la eliminación de orina), juntos se utilizan para el control de la **hipertensión arterial** refractaria a otros medicamentos.

**- Rango y frecuencia**

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es: 1 comprimido al día, excepcionalmente se necesita más de esta dosis, como máximo se puede llegar a los tres comprimidos al día (cada comprimido contiene 20mg. de enalapril y 12.5 de hidroclorotiazida).

**- Consejo de cómo administrarlo**

En el caso de usar una dosis diaria, se recomienda que la tome por la mañana junto con el desayuno. Si son más dosis se recomienda que tome la última dosis varias horas antes de acostarse para no interrumpir su sueño.

**- Uso prolongado**

Debe mantener un constante control médico, además de una revisión regular de la **presión arterial**, y de los niveles de potasio.

### **3.- Precauciones**

**- Mayores de 60 años**

Los ancianos son más sensibles a los efectos adversos de los medicamentos, por lo que debe seguir las indicaciones de su médico durante el tratamiento con enalapril – hidroclorotiazida. En caso de pacientes con deterioro renal la dosis debe ser menor que en pacientes con función renal normal.

**- Consumo de alcohol**

Debe evitar el consumo de alcohol mientras se encuentre en tratamiento con enalapril - hidroclorotiazida, ya que, puede provocar un incremento en el efecto de la droga, o causar mareos y debilidad.

**- Manejo de vehículos**

Este medicamento puede causar en algunas personas mareos y / o disminuir sus capacidades mentales para reaccionar frente a **imprevistos**. Asegúrese del efecto que ejerce este medicamento sobre usted antes de manejar un vehículo o maquinaria peligrosa o realizar cualquier otra actividad riesgosa.

**- Embarazo**

Este medicamento puede causar daño al feto, su uso durante el embarazo está contraindicado. Si usted está embarazada o planifica estarlo debe advertírselo a su médico

**- Lactancia**

Este medicamento pasa a la leche materna y puede dañar al bebé.

**- Lactantes y niños**

No se recomienda su utilización en niños, a menos que su pediatra así lo señale..

**- Precauciones especiales**

Para evitar el riesgo de una caída brusca de su **presión arterial**, se recomienda iniciar el tratamiento con la dosis más baja; según indique su médico, y tomarlo de preferencia en la noche, sobre todo en pacientes ancianos.

Aunque la presión arterial esté controlada y se sienta bien no debe dejar de tomar el medicamento sin consultar a su médico.

Usted debe visitar periódicamente a su médico, para evaluar su presión y tratamiento No interrumpa el tratamiento sin consultar a su médico.

Antes de hacerse algún tipo de cirugía, ya sea dental o de otro tipo debe decirle al médico a cargo o dentista que está en tratamiento con este medicamento.

Este medicamento es una sustancia prohibida en el deporte de competición y puede dar positivo en un control de dopaje.

#### **4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:**

Si ha presentado síntomas de alergia a hidrocortisona y /o enalapril.

Si ha presentado alergia a algún excipiente de la formulación.

#### **5.- Interacciones**

##### **- Medicamentos**

Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta. En este caso se han descrito las interacciones con los siguientes medicamentos: suplementos de potasio, warfarina, medicamentos para el resfriado, alopurinol, glibenclamida, ácido acetilsalicílico y otros **analgésicos** y **antiinflamatorios**, clozapina, ciclosporina, furosemida, probenecid, rifampicina y sales de litio, colestiramina, colestipol, diazóxido, digoxina, amantadina, glibencamida, insulina, tolbutamida, propanolol, atenolol, indometacina.

##### **- Enfermedades**

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el caso particular de este medicamento, si padece de enfermedades **autoinmunes** como **lupus eritematoso sistémico**, **diabetes mellitus**, **estenosis arterial renal**, **gota**, **pancreatitis**.

##### **- Exámenes de laboratorio**

Antes de practicarse algún examen de sangre y / o de orina debe avisar al médico a cargo que está en tratamiento con este medicamento

#### **6.- Efectos adversos**

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: fiebre y escalofríos, dolor de garganta y ronquera, súbita dificultad para respirar, **inflamación** de la cara, boca o extremidades, fiebre, escalofríos, confusión, coloración amarillenta de piel u ojos, picazón intensa, dolor en el pecho o palpitaciones, dolor abdominal, **rash**, hinchazón de boca y garganta, ritmo irregular del corazón, **hemorragias** y moretones inusuales, **hiperglucemia** (fatiga, visión borrosa, náuseas, aumento en la frecuencia para orinar, sed.

##### **- Otros efectos**

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: tos seca y persistente, mareos y dolores de cabeza, alteración en el gusto, sequedad de boca, sedación, **somnolencia**, calambres musculares

#### **7.- Sobredosis**

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: mareos, frío, calambres, desmayos, **letargia**, **somnolencia**, confusión, irritación **gastrointestinal**. Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

#### **8.-Condiciones de almacenamiento:**

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas entre los 15-30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

**No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico**

No recomiende este medicamento a otra persona.