

Nombre: Eritromicina Condición de venta: con receta médica Clasificación: antibiótico Disponible en:	Nombres de marca:
---	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

1.- ¿Para qué se usa?

Este medicamento es usado en el tratamiento de infecciones respiratorias altas y bajas, urinarias, de la piel y tejidos blandos provocados por microorganismos sensibles demostrados por antibiograma.

También es usado en la profilaxis de endocarditis bacteriana en pacientes alérgicos a la penicilina.

Este medicamento exige diagnóstico y supervisión médica.

2.- Administración (oral)

- Rango y frecuencia

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es: 400 mg cada 6 horas o 500 mg. cada 12 horas, esta dosis puede aumentarse hasta 4 g/día según el grado de infección que usted presente.

Debe evitar olvidar alguna toma y respetar los horarios.

Si no cumple el tratamiento lo más probable es que la enfermedad se vuelva a presentar con mayor intensidad y este medicamento ya no le servirá para detener la infección.

- Consejo de cómo administrarlo

Es mejor que tome el medicamento con el estomago vacío una o dos horas después de las comidas, con un vaso grande de agua. Si el medicamento le causa problemas estomacales, se puede tomar con las comidas o con leche.

- Uso prolongado

Debe usarlo durante el tiempo que su médico se lo señale, respetando los horarios y las dosis.

3.- Precauciones

- Mayores de 60 años

Los ancianos son más sensibles a los efectos adversos de los medicamentos, por lo que debe seguir las indicaciones de su médico durante el tratamiento con eritromicina.

- Embarazo

Este medicamento puede causar daño al **feto**, usted debe consultar al médico, antes de usar este medicamento si está embarazada.

- Lactancia

Este medicamento pasa a la leche materna y puede afectar al lactante. Converse con su médico la conveniencia de seguir el tratamiento o dejar de amamantar.

- Precauciones especiales

Si después de unos días, sus síntomas no mejoran o empeoran debe consultar con su médico.

Debe tomar con especial precaución este medicamento si padece de **porfiria**.

Tome el medicamento por todo el período que su médico le ha indicado aunque sienta que los síntomas hayan desaparecido, ya que la infección podría presentarse nuevamente.

4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia a eritromicina, amikacina, tobramicina o kanamicina.

Si ha presentado alergia a algún excipiente de la formulación.

5.- Interacciones

- Medicamentos

Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta. En este caso se han descrito las interacciones con los siguientes medicamentos: alcohol etílico, alfentanilo, verapamilo, lidocaina, clorfenamina, carbamazepina, fenitoina, warfarina, diazepam, alprazolam, bromocriptina, buspirona, ciclosporina, cimetidina, colchicina, prednisona, digoxina, ergotamina, lovastatina, penicilina, amoxicilina, teofilina, vinblastina, zopiclona.

- Enfermedades

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el caso particular de este medicamento, si padece de desordenes en el ritmo del corazón, problemas auditivos.

6.- Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: fiebre, náuseas, vómitos, picazón o enrojecimiento de la piel, severo dolor estomacal, coloración amarilla en la piel o en los ojos, desmayos, irregularidad en el ritmo del corazón, dificultad para respirar, diarrea persistente o severa, dolor abdominal, sordera temporal.

- Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: dolor abdominal leve, náuseas, diarrea leve, **hiperacidez** gástrica, calambres abdominales.

7.- Sobredosis

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: náuseas severas, vómitos, dolor abdominal,

diarrea, mareos y pérdida de la audición. Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la intoxicación y tratarla adecuadamente. Debe llevar el envase del medicamento que se ha tomado.

8.-Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona.

