

## EXTRACTO LIOFILIZADO DE ESCHERICHIA COLI CAPSULAS ORALES 6 MG

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregúntele a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente.

### 1-Composición:

Cada cápsula contiene:  
Extracto liofilizado de Escherichia coli :6 mg  
Excipientes Según lo aprobado en Registro

### 2- Clasificación Terapéutica

Inmunoterapia de las infecciones del sistema urinario.

### 3.-Vía de administración:

Oral

### 4-Indicaciones :

Coadyuvante Junto con otras medidas en la prevención de infecciones recurrentes de las vías urinarias inferiores.

Coadyuvante en el tratamiento de las infecciones agudas de las vías urinarias.

### 4- Advertencias y Precauciones:

Antes de usar este medicamento debe sopesarse los riesgos y los beneficios en su uso, los que deben ser discutidos entre Ud. y su médico. Principalmente debe considerar los aspectos siguientes:

**Alergias:** Debe comunicar a su médico si alguna vez ha presentado una reacción alérgica a este medicamento o alguna otra sustancia, ya sea alimentos, preservantes, colorantes, saborizantes u otros medicamentos.

**Embarazo:** No debe tomar este medicamento sin antes comunicar a su médico si está embarazada o planea estarlo. No se recomienda su uso durante el embarazo, a menos que su médico le indique lo contrario.

**Lactancia:** No se recomienda su uso durante la lactancia, a menos que su médico le indique lo contrario.

**Niños:** No se ha establecido la seguridad y eficacia de este medicamento en niños menores de 4 años, por lo cual no se recomienda su uso en menores de esta edad, a menos que su médico le indique lo contrario.

### 6- Interacciones:

El efecto de un medicamento puede modificarse por su administración junto con otros (interacciones). Ud. debe comunicar a su médico de todos los medicamentos que está tomando ya sea con o sin receta médica antes de usar este fármaco.

Ninguna interacción con otros medicamentos es conocida hasta la fecha.

### **7- Contraindicaciones:**

Hipersensibilidad conocida al principio activo o a cualquiera de los componentes del producto.

### **8- Efectos Adversos :**

Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se pretende obtener. Algunos de estos pueden requerir atención médica.

Los efectos indeseables más frecuentemente reportados son:

A nivel gastrointestinal: diarreas, náuseas, dolor abdominal.

A nivel cutáneo: prurito, exantema.

También se ha presentado infrecuentemente fiebre ligera.

En los casos de reacciones cutáneas o febriles, el tratamiento debería ser interrumpido, y consultar inmediatamente a su médica, ya que puede tratarse de reacciones alérgicas.

Si usted nota cualquier otro efecto molesto no mencionado consulte a su médico.

### **9-Modo de Uso y dosis :**

Este medicamento se administra por vía oral, en ayunas.

El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiado a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es:

Tratamiento preventivo y/o terapia de consolidación: 1 cápsula diaria en ayunas durante tres meses consecutivos.

Tratamiento de los episodios agudos: 1 cápsula diaria en ayunas como adyuvante a las terapias antiinfecciosas usuales hasta la desaparición de los síntomas o cuando menos durante 10 días consecutivos.

### **9.-Presentación:**

Según lo aprobado en Registro.

### **10-Condiciones de Almacenamiento:**

Según lo aprobado en Registro

**Revisado el 3 de enero del 2007**