

<b>Nombre:</b> Escopolamina (Hioscina)	<b>Nombres de marca:</b>
<b>Condición de venta:</b> con receta médica	
<b>Clasificación:</b> antiespasmodico	
<b>Disponible en:</b>	

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

### 1.- ¿Para qué se usa?

Se utiliza para el tratamiento de **espasmos** de origen intestinal, **biliar**, renal y del aparato **genital** femenino, y en otras condiciones determinadas por su médico.

### 2.- Administración (I.M., S.C., I.V.)

#### - **Rango y frecuencia**

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es: 0.3-0.65 mg. 3 ó 4 veces al día.

La dosis pediátrica es de 0.006 mg./Kg.de peso

#### - **Uso prolongado**

Si los síntomas persisten o se intensifican debe consultar, nuevamente, con su médico.

### 3.- Precauciones

#### - **Mayores de 60 años**

Los ancianos son más sensibles a los efectos adversos de los medicamentos, por lo que debe seguir las indicaciones de su médico durante el tratamiento con escopolamina.

#### - **Consumo de alcohol**

Evite el consumo de alcohol mientras está en tratamiento con este medicamento, ya que se aumentan los riesgos de efectos adversos de escopolamina.

#### - **Manejo de vehículos**

Asegúrese del efecto que tiene sobre usted este medicamento, antes de manejar un vehículo o maquinaria peligrosa, ya que este medicamento puede causar visión borrosa.

#### - **Embarazo**

No se ha reportado que el uso de este medicamento durante el embarazo cause daño en el **feto**, sin embargo debe consultar con su médico antes de utilizar este medicamento si se encuentra embarazada.

#### - **Lactancia**

Debe consultar al médico antes de usar este medicamento si está amamantando, ya que se puede producir una disminución del flujo de leche en algunas mujeres.

#### - **Lactantes y niños**

El uso de este medicamento en niños debe ser previa consulta a su pediatra, ya que puede causar reacciones adversas como **hiperexcitabilidad** en niños.

#### **4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:**

Si ha presentado síntomas de alergia a escopolamina.

Si ha presentado alergia a algún excipiente de la formulación.

Si padece de glaucoma o miastenia gravis.

#### **5.- Interacciones**

##### **- Medicamentos**

Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando ya sea con o sin receta médica. En este caso se han descrito interacciones con los siguientes medicamentos: prednisona, haloperidol, amantadina, imipramina, clorfenamina, loratadina, metoclopramida, buclizina, ciclizina, ciclobenzaprina, ipratropio, loxapina, maprotilina, meclizina, metilfenidato, orfenadrina, fenotiazinas, pimozida, procainamida, antiácidos, antidiarreicos, guanetidina, reserpina, ketoconazol, apomorfina, carbamazepina, lorazepam.

##### **- Enfermedades**

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el caso particular de este medicamento, si padece de **glaucoma**, **miastenia gravis**, **taquicardia**, retención urinaria, **megacolon**, **hipertrofia prostática**, problemas a la vejiga, daño cerebral, colitis, fiebre, **hernia hiatal**, **hipertensión**, alguna enfermedad pulmonar crónica, dificultad para orinar, **síndrome de Down**, **hipotiroidismo**.

#### **6.- Efectos adversos**

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: taquicardia, dificultad para respirar, confusión, mareos, rash, dolor de ojos, convulsiones, somnolencia, sequedad de boca, nariz o garganta, fiebre, alucinaciones, excitación, nerviosismo, irritabilidad.

##### **- Otros efectos**

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: somnolencia, sensación de mal estar, confusión, visión borrosa, ansiedad, irritabilidad, constipación, dificultad para orinar, dolor de cabeza.

#### **7.- Sobredosis**

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: sequedad de boca, dificultad para orinar, taquicardia, somnolencia, cansancio severo, visión borrosa, mareos, fiebre, alucinaciones, convulsiones.

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

**8. -Condiciones de almacenamiento:**

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

**No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico**

**No recomiende este medicamento a otra persona**