

<b>Nombre:</b> Etofenamato tópico <b>Condición de venta:</b> sin receta médica de uso tópico <b>Clasificación:</b> Analgésico, Antipirético, Antiinflamatorio <b>Disponible en:</b>	<b>Nombres de marca:</b>
--	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

#### 1.- ¿Para qué se usa?

Este medicamento está indicado en el tratamiento sintomático tópico de:

- Estados inflamatorios.
- Coadyuvante de enfermedades reumáticas.
- Traumatismos varios; incluyendo lesiones del deporte.

#### 2.- Administración (tópica)

- **Rango y frecuencia**

Se recomienda aplicar 3 g. de gel al 5% (5 a 10 cm. De longitud) tres a cuatro veces al día.

#### Consejo de cómo administrarlo

Debe aplicarlo sobre la piel limpia la cantidad necesaria para abarcar toda la zona afectada con un leve masaje, se debe lavar las manos antes y después de la aplicación.

- **Uso prolongado**

Puede causarle problemas de irritación y ardor de la zona de aplicación.

#### 3.- Precauciones

- **Embarazo**

Este medicamento puede ser **absorbido** por la piel, por lo que no se recomienda su uso durante el embarazo.

#### Lactancia

Este medicamento puede ser **absorbido** por la piel, por lo que debe consultar al médico antes de usarlo si está amamantando.

- **Lactantes y niños**

Se recomienda consultar al médico antes de usarlo en niños, especialmente en menores de 2 años.

- **Precauciones especiales**

Debe usarlo sólo sobre la piel sana, sin heridas ni lesiones abiertas. Debe evitar la aplicación en los ojos o mucosas (si esto ocurre lave con abundante agua).

Si después de unos días, sus síntomas no mejoran o empeoran debe consultar con su médico.

#### 4.- Usted no debe usar este medicamento en los siguientes casos:

Si presenta heridas o irritación en la zona afectada.

Si ha presentado alergia al medicamento o a otros medicamentos como el ácido acetilsalicílico (aspirina).

Si ha presentado alergia a algún excipiente de la formulación.

#### **5.- Interacciones**

##### **- Medicamentos**

Usted debe consultar con el farmacéutico la conveniencia de usar este medicamento, si está utilizando otros, aunque al aplicarlo sobre la piel el riesgo de interacciones es bajo.

#### **6.- Efectos adversos**

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: reacciones de hipersensibilidad (alergia), tales como ronchas en la piel, hinchazón, dificultad para respirar, debe acudir de inmediato a su médico o al centro asistencial más cercano, llevando el envase del medicamento.

##### **- Otros efectos**

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: irritación local, sensación de quemaduras, picazón, enrojecimiento de la piel.

#### **7.- Sobredosis**

Si se aplica sobre heridas, áreas extensas de la piel o si se aplica con vendaje, existe la posibilidad de una mayor absorción y aparición de efectos adversos. Lavar con abundante agua.

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la intoxicación y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

#### **8.-Condiciones de almacenamiento:**

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

#### **No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico**

No recomiende este medicamento a otra persona.