

Nombre: Famotidina (I) 10mg Condición de venta: sin receta médica Clasificación: antiulceroso Disponible en:	Nombres de marca:
---	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

1.- ¿Para qué se usa?

Este medicamento es usado para el alivio del ardor y acidez estomacal.

2.- Administración (oral)

- Rango y frecuencia

La dosis general recomendada es de 10 mg. de famotidina una o dos veces al día por un periodo máximo de 2 semanas, su uso por un tiempo mayor requiere vigilancia médica.

- Consejo de cómo administrarlo

Puede tomarlo con leche para minimizar la irritación estomacal.

- Uso prolongado

No debe utilizarlo por más de 3 días sin control médico. Si los síntomas persisten consulte al médico. Su uso por periodos prolongados puede enmascarar una enfermedad grave.

3.- Precauciones

- Mayores de 60 años

Las reacciones adversas pueden ser mayores y más severas en pacientes ancianos.

- Consumo de alcohol

Debe evitar el consumo de alcohol mientras utiliza este medicamento, ya que este puede demorar más su recuperación, ya que el alcohol irrita el estomago.

- Manejo de vehículos

Este medicamento puede causar en algunas personas mareos y / o disminuir sus capacidades mentales para reaccionar frente a **imprevistos**. Asegúrese del efecto que ejerce este medicamento sobre usted antes de manejar un vehículo o maquinaria peligrosa o realizar cualquier otra actividad riesgosa.

- Embarazo

Este medicamento puede causar daño al **feto**, usted debe señalar al médico, que está embarazada o puede estarlo, antes de usar este medicamento.

- Lactancia

Este medicamento pasa a la leche materna y puede afectar al lactante. Converse con su médico la conveniencia de seguir el tratamiento o dejar de amamantar.

- Lactantes y niños

En general no se utiliza en niños ni lactantes.

- Precauciones especiales

Si después de unos días, sus síntomas no mejoran o empeoran debe consultar con su médico.

Se debe evitar fumar cigarrillos durante el tratamiento con famotidina, ya que el cigarrillo y el alcohol aumentan la acidez estomacal y pueden interferir con el efecto del medicamento.

4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Cuando se han presentado síntomas de alergia al medicamento.

Si ha presentado alergia a algún excipiente de la formulación.

5.- Interacciones

- Medicamentos

Usted debe consultar con el farmacéutico la conveniencia de usar este medicamento, si está tomando otros, particularmente ketoconazol, ya que se puede disminuir la acción de este último. También debe consultar si va a tomar antiácidos.

- Enfermedades

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el caso particular de este medicamento, si padece de enfermedades a los riñones.

- Alimentos

Algunas bebidas ácidas, jugos cítricos, y otro tipo de comidas y líquidos ácidos pueden hacer menos efectiva la acción de famotidina.

6.- Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: ritmo irregular del corazón (palpitaciones), o disminución en el ritmo de este; problemas severos a la sangre, como **hemorragias**, moretones, fiebre, escalofríos, y mayor susceptibilidad a las infecciones.

- Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: dolor de cabeza, fatiga, somnolencia, mareos, náusea, dolor abdominal, diarrea, **constipación**, visión borrosa, disminución del deseo o función sexual, insomnio.

7.- Sobredosis

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: confusión, aumento en el ritmo del corazón, dificultad para respirar, delirio. Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

8.-Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona.