

## **FOSFATO DE SODIO 6%, BIFOSTATO DE SODIO ENEMA 16% ADULTOS Y NIÑOS**

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.  
Contiene información importante acerca de su tratamiento.  
Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o farmacéutico.  
Guardé este folleto puede necesitar leerlo nuevamente.  
Verifique que este medicamento corresponda exactamente al indicado por su médico.

- **Composición:**

Cada 100 mL de solución contiene:  
Fosfato de sodio: 6,0 g  
Bifosfato de sodio: 16,0 g  
Excipientes. Según lo aprobado en registro.

**Clasificación:**

Evacuante intestinal

**¿Para qué se usa?**

Se utiliza como evacuante intestinal. Para la preparación del colon previo a realización de exámenes, limpieza intestinal previa a intervenciones quirúrgicas y parto.

**Vía de Administración:**

Rectal

**Rango y frecuencia:**

El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiado a su caso particular, no obstante las dosis usuales recomendada es:

Adultos y mayores de 12 años: un envase de 120 ml  
Niños de 5 a 12 años: un envase de 60 ml  
Niños de 2 a 5 años: la mitad de un envase de 60 ml

**Uso prolongado:**

El uso frecuente y prolongado de evacuantes intestinales puede producir hábito.

**Modo de uso:**

Para aplicar el enema se recomienda elegir la posición más conveniente:

- Posición a la izquierda: Recostarse sobre el lado izquierdo con las rodillas dobladas y los brazos relajados.
- Posición de rodillas, sobre el pecho: Arrodillarse, bajar la cabeza y el pecho hacia delante hasta que el lado izquierdo de la cara descansa sobre la superficie, colocando el brazo izquierdo confortablemente.

- Auto-aplicación: Acostarse de espaldas y flexionar las piernas, reposando sobre una toalla, de preferencia colocada sobre el piso del baño. Con presión firme, insertar nuevamente el enema en el recto, con la punta hacia el ombligo.

Apretar el frasco hasta que casi todo el líquido haya salido. Retirar suavemente la cánula del recto.

Mantener la posición adoptada hasta que sienta un fuerte deseo de evacuar generalmente 2 a 5 minutos .

## **Precauciones**

### **Mayores de 60 años**

Los ancianos son más sensibles a los efectos adversos de los medicamentos, por lo que debe tener especial precaución. No debe usarse en forma repetida en pacientes ancianos o gravemente enfermos por riesgo de alteraciones hidroelectrolíticas desencadenadas por la absorción de algunos componentes salinos.

### **Lactantes y niños**

El uso de este medicamento en niños debe ser previa consulta a su pediatra. Este medicamento está permitido desde los 2 años de edad. No debe ser utilizado en lactantes.

### **Precauciones especiales**

Si luego de la administración del producto no sucede la expulsión de líquido, deberá consultar inmediatamente al médico.

Si su uso produce dolores u otros efectos desacostumbrados, consulte al médico. En caso de dosis excesiva accidental, consulte al médico inmediatamente.

Usar con precaución en pacientes con alteraciones renales.

### **Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:**

- No usar en presencia de náusea, vómitos, fiebre, ni dolores abdominales.
- No usar en niños menores de 2 años.
- No usar en caso de megacolon.
- No usar en pacientes con obstrucción intestinal, ano perforado, insuficiencia cardíaca congestiva, apendicitis o síntomas de ésta (dolor o calambres a nivel estomacal, hinchazón, inflamación, náuseas, vómitos), hipertensión arterial y/o sangramiento rectal sin diagnóstico.
- No usar si es alérgica al picosulfato de sodio o alguno de sus excipientes

## **Interacciones**

### **Con Medicamentos:**

Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta, especialmente si toma diuréticos u otros medicamentos para controlar la presión u otros problemas cardiovasculares

### **Con Enfermedades:**

Usted debe consultar a su médico antes de usar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, cardiovascular o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el

caso particular de este medicamento, si padece de antecedentes de insuficiencia cardiaca congestiva, hipertensión arterial y enfermedades intestinales.

**Efectos adversos:**

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: En área rectal: sangramiento, aparición de ampollas, picazón, dolor o sensación de ardor, irritación. En algunos casos también se han presentado convulsiones.

**Sobredosis:**

Puede llevar a severas alteraciones electrolíticas incluyendo hiperfosfatemia, hipernatremia, hipocalcemia e hipokalemia, deshidratación e hipovolemia con signos y síntomas de deshidratación, acidosis metabólica y falla renal.

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la intoxicación y tratarla adecuadamente. Debe llevar el envase del medicamento que se ha tomado. El tratamiento consiste normalmente en rehidratación y si es necesario la administración intravenosa de gluconato de calcio al 10%.

**Presentación:**

Según lo aprobado en registro

**Condiciones de almacenamiento:**

Según lo aprobado en registro.

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona.

**REVISADO EL 22 DE FEBRERO DEL 2007**