

Nombre: Ftalilsulfatiazol - Nifuroxazida Condición de venta: con receta médica Clasificación: antidiarreico Disponible en:	Nombres de marca:
---	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

1.- ¿Para qué se usa?

Este medicamento es utilizado en el tratamiento de la diarrea agudas y crónicas de origen bacteriano, en ausencia de sospecha de fenómenos invasivos.

Este medicamento exige diagnóstico y supervisión médica

2.- Administración (oral)

- Rango y frecuencia

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es: 500 mg. de ftalilsulfatiazol y 200 mg. de nifuroxazida (1 comprimido) cada 6 horas sin exceder los 2g. de ftalilsulfatiazol y 800 mg. de nifuroxazida al día (4 comprimidos).

No sobrepasar los 7 días de tratamiento.

- Consejo de cómo administrarlo

Debe tomar el medicamento con un vaso de agua, y debe evitar comer frutas y verduras durante el tratamiento.

- Uso prolongado

Una diarrea no debe durar más de 2 días, si esto ocurre o se presenta fiebre debe consultar con su médico.

3.- Precauciones

- Mayores de 60 años

Las diarreas en pacientes ancianos pueden provocar una **deshidratación** severa por lo que se recomienda visitar a su médico para que él evalúe su estado

- Consumo de alcohol

No debe consumir alcohol durante el tratamiento con este medicamento, ya que este puede empeorar su estado.

- Manejo de vehículos

Este medicamento puede causar en algunas personas mareos y / o disminuir sus capacidades mentales para reaccionar frente a **imprevistos**. Asegúrese del efecto que ejerce este medicamento sobre usted antes de manejar un vehículo o maquinaria peligrosa o realizar cualquier otra actividad riesgosa.

- **Embarazo**

Este medicamento puede causar daño al **feto**, usted debe conversar con su médico sobre la conveniencia de usar este medicamento si está embarazada.

- **Lactancia**

Debe consultar al médico antes de usar este medicamento si está amamantando.

- **Lactantes y niños**

El uso de este medicamento en niños debe ser previa consulta a su pediatra. No se debe administrar a recién nacidos.

- **Precauciones especiales**

Debe tomar bastante agua para evitar **deshidratarse** mientras se encuentre con diarrea. Si junto con la diarrea presenta sangre en las heces, náuseas, vómitos o fiebre debe consultar con su médico.

4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia a nifuroxazida y / o ftalilsulfatiazol.

Si ha presentado síntomas de alergia a algún excipiente de la formulación.

5.- Interacciones

- **Medicamentos**

Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta. En este caso se han descrito las interacciones con los siguientes medicamentos: warfarina, acenocumarol.

- **Enfermedades**

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el caso particular de este medicamento, si padece de **disentería**.

- **Alimentos**

Debe evitar consumir alimentos que pueden aumentar la diarrea, como: frutas, comidas picantes o fritas, salvado, golosinas y alimentos o bebidas que contengan **cafeína**.

6.- Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: dolor abdominal, vómitos, mareos, sequedad de boca, disminución de la cantidad de orina o de la frecuencia para orinar.

- **Otros efectos**

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: constipación.

7.- Sobredosis

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

8.-Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona.