

Nombre: Fluticasona Condición de venta: con receta médica Clasificación: corticosteroide inhalatorio Disponible en:	Nombres de marca:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------

1.- ¿Para qué se usa?

Este medicamento se usa como tratamiento profiláctico del asma leve, moderada o severa.

2.- Administración (inhalatorio)

- Rango y frecuencia

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es:

❖ Adultos y niños mayores de 16 años:

- Asma leve: 100 a 250 microgramos dos veces al día.
- Asma moderada: 250 a 500 microgramos dos veces al día.
- Asma severa: 500 a 1000 microgramos dos veces al día.

❖ Niños mayores de 4 años:

- 50 a 100 microgramos dos veces al día, aumentando a 200 microgramos dos veces al día si fuera necesario.

- Consejo de cómo administrarlo

Se recomienda expulsar el aire y luego aplicar el puff en conjunto con la inspiración.

Puede aplicarse el medicamento antes o después de las comidas.

La aplicación debe hacerse con una mascarilla para que así se obtenga una mejor llegada del medicamento a los pulmones y no se quede retenido en la garganta donde se pueden producir infecciones oportunistas.

Luego de cada aplicación debe enjuagarse la boca con abundante agua.

- Uso prolongado

Debe usarlo durante el tiempo que su médico se lo señale, respetando los horarios y las dosis.

3.- Precauciones

- Mayores de 60 años

No existe recomendación especial para los ancianos.

- Manejo de vehículos

Es poco probable que el medicamento afecte su capacidad de concentración y estado de alerta.

- Embarazo

Este medicamento puede afectar al **feto**, usted debe conversar con su médico la conveniencia de usar este medicamento si está embarazada

- Lactancia

Este medicamento puede pasar en pequeñas cantidades a la leche materna, debe consultar al médico sobre la conveniencia de usar este medicamento si está amamantando.

- Lactantes y niños

Este medicamento puede retardar el crecimiento normal del niño, el pediatra debe evaluar el **riesgo/beneficio** de su administración. Los niños en tratamiento deben ir en forma

periódica al pediatra, ya que se debe evaluar si su crecimiento es normal. Su uso no está recomendado en niños menores de 4 años.

Se debe evitar exponer al niño a un contagio con sarampión o peste cristal, si el niño llega a contraer cualquiera de estas enfermedades, avise inmediatamente al pediatra

- Precauciones especiales

Antes de realizarse una cirugía (incluso dental) o tratamiento de emergencia debe avisar al médico que se encuentra en tratamiento con este medicamento.

Si usted sufre de alguna infección, este medicamento puede agravar la infección.

Si usted tiene antecedentes de tuberculosis, el uso de este medicamento puede reactivar la enfermedad.

Puede ser que usted use este medicamento por dos o más semanas antes de que sienta alguna mejoría, si después de este tiempo usted no siente alivio de su asma, consulte con su médico.

4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia a fluticasona.

Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.

Este medicamento no debe ser usado durante ataques agudos de asma.

5.- Interacciones

- Medicamentos

Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta. En este caso se han descrito las interacciones con los siguientes medicamentos: corticoesteroides sistémicos como prednisona, betametasona y azatioprina.

- Enfermedades

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa.

En el caso particular de este medicamento, si padece de **osteoporosis**, **tuberculosis**, alguna infección en la boca, garganta o pulmonar, **herpes**.

6.- Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: dificultad para respirar, opresión o silbidos en el pecho, nerviosismo, manchas blancas en la boca.

- Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: sequedad de la boca, cambios en la voz, resfrío, dolor de cabeza, náuseas.

7.- Sobredosis

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

8.-Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona.