

Nombre: Gramicidina – Neomicina – Polimixina B Condición de venta: con receta médica de uso oftálmico Clasificación: antibiótico Disponible en:	Nombres de marca:
--	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

1.- ¿Para qué se usa?

Este medicamento está indicado como tratamiento a corto plazo de las infecciones oculares externas superficiales producidas por organismos sensibles.

Este medicamento exige diagnóstico y supervisión médica.

2.- Administración (tópica)

- Rango y frecuencia

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es de 1 a 2 gotas en el ojo afectado 2 a 4 veces al día o más frecuentemente si es requerido por 7 a 10 días. En caso de infecciones agudas se puede aplicar 1 a 2 gotas cada 15 a 30 minutos inicialmente, reduciendo la frecuencia de aplicación gradualmente según la respuesta clínica.

Debe evitar olvidar alguna aplicación y respetar los horarios. Si no cumple el tratamiento lo más probable es que la enfermedad se vuelva a presentar con mayor intensidad y este medicamento ya no le servirá para detener la infección.

- Consejo de cómo administrarlo

Antes y después de aplicar el medicamento debe lavarse las manos.

Debe aplicar el medicamento sobre la **conjuntiva**, sin poner en contacto la punta del envase con el ojo, debe dejar caer la gota sobre el ojo, luego debe mantener los ojos cerrados por 1 a 2 minutos para permitir una mejor distribución del medicamento. El envase debe mantenerse cerrado de forma ajustada.

- Uso prolongado

No debe utilizar este medicamento por más o menos días que los indicados por su médico.

3.- Precauciones

- Mayores de 60 años

No existe recomendación especial para los ancianos.

- Manejo de vehículos

Es poco probable que el medicamento afecte su capacidad de concentración y estado de alerta.

- Embarazo

Este medicamento puede ser **absorbido** por la piel, por lo que debe consultar al médico antes de usarlo si está embarazada.

- Lactancia

No se ha reportado que este medicamento cause problemas durante el periodo de lactancia, sin embargo debe consultar al médico antes de usarlo si está amamantando.

- Lactantes y niños

El uso de este medicamento en niños debe ser previa consulta a su pediatra.

- Precauciones especiales

Si después de unos días, sus síntomas no mejoran o empeoran debe consultar, nuevamente, con su médico.

Este medicamento es de uso personal, ya que si lo comparte con otra persona se puede producir un contagio de la infección.

4.- Usted no debe usar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia a gramicidina, neomicina, polimixina B u otra solución o ungüento oftálmico.

Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.

5.- Interacciones

- Medicamentos

Usted debe consultar con su médico la conveniencia de usar este medicamento, si está utilizando otros, aunque al aplicarlo sobre los ojos el riesgo de interacciones es bajo.

6.- Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: reacciones de hipersensibilidad (alergia), tales como ronchas en la piel, hinchazón, dificultad para respirar.

- Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: irritación local, sensación de quemaduras, picazón, aumento e la secreción de lágrimas.

7.- Sobredosis

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la intoxicación y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

8.- Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona.