

Nombre: Hidróxido de magnesio Condición de venta: sin receta médica Clasificación: antiácido Disponible en:	Nombres de marca:
--	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

1.- ¿Para qué se usa?

Este medicamento se utiliza para el alivio temporal de la acidez estomacal.

2.- Administración (oral)

- Rango y frecuencia

Dosis adultos: 500 a 1000 mg tres veces al día. Máximo 5g al día.

- Consejo de cómo administrarlo

Se le recomienda tomar el medicamento entre 1 y 3 horas después de las comidas y antes de ir a dormir. Las tabletas se pueden masticar o dejar disolver lentamente en la boca.

- Uso prolongado

No debe utilizar este medicamento por más de 1 semanas sin indicación médica. Se recomienda beber abundante agua.

3.- Precauciones

- Mayores de 60 años

En los pacientes ancianos se puede presentar **diarrea** o problemas intestinales, por lo que sólo debe utilizar este medicamento bajo indicación de su médico.

- Consumo de alcohol

El consumo de alcohol disminuye el efecto de este medicamento, por lo que no debe beber alcohol durante el tratamiento. Por otra parte el alcohol es irritante del estomago y puede empeorar su mal estar.

- Embarazo

Este medicamento puede causar daño al **feto**, usted debe consultar al médico, antes de usar este medicamento si está embarazada.

- Lactancia

Este medicamento pasa a la leche materna, por lo que debe discutir con su médico la conveniencia de usar este medicamento o de suprimir la lactancia.

- Lactantes y niños

No se debe usar antiácidos en niños menores de 6 años, a menos que su pediatra lo indique. Se pueden observar serios efectos adversos en niños pequeños, deshidratados o con enfermedad renal.

- Precauciones especiales

Si los síntomas de acidez persisten en el tiempo debe consultar con su médico, ya que el uso frecuente de antiácidos podría ocultar una enfermedad más grave.

4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia al medicamento.

Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.

Si presenta síntomas de apendicitis o de intestino inflamado.

Dentro de 1 a 2 horas o más de haber tomado otros medicamentos por vía oral.

5.- Interacciones

- Medicamentos

Usted debe consultar con el farmacéutico la conveniencia de usar este medicamento, si está tomando otros, particularmente: bisacodil, digoxina, sales de fierro, isoniazida, ketoconazol, penicilamina, fosfatos, salicilatos, tetraciclinas.

- Enfermedades

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el caso particular de este medicamento, si padece de **apendicitis** o de **inflamación** intestinal, **Alzheimer**, **constipación** crónica, colitis, **ileostomia**, **colostomia**, bloqueo intestinal o estomacal, fractura de huesos, diarrea, **hipofosfatemia**, **edema**, **hemorragia** intestinal o estomacal.

6.- Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: dificultad para orinar, mareos, sensación de mal estar, ritmo irregular del corazón, pérdida del apetito, dolor muscular, náuseas, vómitos, nerviosismo, dificultad para respirar.

- Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: sabor a tiza o yeso en la boca, **diarrea** suave, calambres estomacales

7.- Sobredosis

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: diarrea, hinchazón, dolor muscular, dificultad para respirar, coma. Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la intoxicación y tratarla adecuadamente. Debe llevar el envase del medicamento que se ha tomado.

8.-Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor, luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona.

