

Nombre: Ibuprofeno - Paracetamol (Acetaminofeno) Condición de venta: con receta médica simple Clasificación: Analgésico, Antipirético Disponible en:	Nombres de marca:
---	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

Composición y presentación:

Principio Activo: Ibuprofeno - Paracetamol (Acetaminofeno)

Excipientes: se deben detallar, según última fórmula aprobada en el registro

1. - ¿Para qué se usa?

Esta asociación de medicamentos está indicada en el alivio de procesos inflamatorios y dolorosos de intensidad leve a moderada que se acompañan de cuadros febriles.

2. - Administración y dosis:

Se recomienda administrarlo junto con los alimentos.

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es: 325 a 650 mg de paracetamol y 200-300 mg de ibuprofeno cada 4-6 horas. Si la fiebre o los síntomas de dolor y/o inflamación persisten la dosis se puede aumentar a 600 mg de paracetamol y 400-600 mg de ibuprofeno cada 6 horas; sin exceder los 1200 mg de ibuprofeno por día.

3. - Advertencias

Este medicamento puede causar serios problemas al hígado, a los riñones, o anemia, problemas estomacales (úlceras) y hemorragias en algunos pacientes, por lo que debe tomarlo sólo por el tiempo indicado por su médico. En caso de dolor no usar mas de 5 días y en caso de fiebre no mas de tres días, sin control médico.

El uso prolongado y la administración de altas dosis de paracetamol pueden provocar daño hepático severo.

4. - Precauciones

Mayores de 60 años: Los problemas estomacales pueden ser severos en pacientes mayores de 60 años.

Consumo de alcohol: Se debe evitar consumir alcohol, la combinación de éste con paracetamol - ibuprofeno puede provocar serios problemas al hígado, problemas estomacales y hemorragias.

Embarazo: Este medicamento puede causar daño al feto, usted debe conversar con su médico sobre la conveniencia de usar este medicamento si está embarazada.

Lactancia: Este medicamento puede pasar en pequeñas cantidades a la leche materna, debe consultar al médico sobre la conveniencia de usar este medicamento si está amamantando.

Uso en niños: El uso de este medicamento en niños debe hacerse previa consulta a su pediatra.

Precauciones especiales

Algunos preparados pueden llevar como endulzante aspartamo, en tal caso debe tener precaución si padece de fenilcetonuria.

Este tipo de medicamentos interfiere en la coagulación de la sangre, por lo que se recomienda dejar de tomarlo por lo menos tres días antes de someterse algún tipo de cirugía.

Usted debe consultar a su médico antes de usar este medicamento si tiene o ha tenido alguna enfermedad al corazón (como angina de pecho, infarto agudo al miocardio, insuficiencia cardíaca)

Debe comunicar a su médico si sufre o ha sufrido problemas de hemorragia gastrointestinal o úlceras estomacales

- Enfermedades

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, cardiovascular o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el caso particular de este medicamento, si padece de diabetes mellitus, fenilcetonuria, o un historial de abuso de alcohol, hemorragias, inflamación o úlceras en el estomago e intestinos, lupus eritematoso sistémico, anemia, asma, epilepsia, enfermedad de Parkinson, cálculos renales, o historia de enfermedades al corazón, enfermedades renales o al hígado.

5.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha ingerido alcohol, si tiene algún tipo de daño hepático o renal (en algunos casos el médico puede hacer un ajuste de dosis).

Si usted ha presentado síntomas de alergia al paracetamol, ibuprofeno u otro componente de la formulación.

No debe usar este medicamento en el período inmediato a un by-pass coronario

Usted deberá suspender el medicamento y consultar al médico en las siguientes condiciones:

- Si los síntomas no mejoran
- Si aparecen otros síntomas
- Si el dolor o la fiebre no mejoran o empeoran
- Si junto con el dolor de garganta presenta dolor de cabeza, manchas en la piel, náuseas o vómitos.

6.- Interacciones

- Medicamentos

Usted debe consultar con el farmacéutico la conveniencia de usar este medicamento, si está tomando otros, particularmente anticoagulantes (como warfarina), fenobarbital, carbamazepina, fenitoína, sulfapirazonas, isoniazida, nicotina, o zidovudina, medicamentos para la presión, prednisona, antibióticos en general, itraconazol o ketoconazol, penicilamina,

ácido valproico, ciclosporina, digoxina o digitoxina, litio, metotrexato, probenecid, triamtereno. No se debe tomar en forma conjunta con otros medicamentos como ácido acetilsalicílico (aspirina) (o similares) a menos que su médico así lo determine.

7. - Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: reacción alérgica al paracetamol, que se presenta con rash, picazón, hinchazón, o dificultad para respirar; piel y ojos de color amarillo (indican daño hepático), dolor de garganta y fiebre (que no se han presentado antes del tratamiento, y que no responden a causas de la condición que se está tratando), hemorragias o moretones sin razón aparente, sangre en la orina, dolor, menor o mayor frecuencia al orinar, dificultad para respirar, con o sin adormecimiento de las pierna, dolor en el pecho, úlcera péptica con vómitos con sangre, melena.

- Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: fatiga o debilidad, náuseas, diarrea leve, constipación leve, dolor de cabeza leve, vértigo, somnolencia, úlceras o dolor en la boca, inusuales temblores o entumecimiento de las manos o los pies.

8. - Sobredosis

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: diarrea, pérdida del apetito, náuseas o vómitos, calambres o dolor estomacal, desmayos, dolor de cabeza severo, confusión y malestar. Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la intoxicación y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

8. -Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona.