

Nombre: I doxuridina oftálmico Condición de venta: sin receta médica de uso tópico Clasificación: antiviral Disponible en:	Nombres de marca:
---	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

1.- ¿Para qué se usa?

Se utiliza para el tratamiento de infecciones oftálmicas causadas por virus.

2.- Administración (tópica)

- Rango y frecuencia

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es de inicialmente una gota de solución oftálmica al 0.1% en cada ojo infectado cada una hora durante el día y cada dos horas durante la noche hasta tener una mejora significativa, luego se debe continuar con una gota cada dos horas en el día y cada cuatro horas durante la noche, se recomienda continuar la terapia 3 a 5 días después de que la cura parece ser completa. La terapia total no debería ser mayor de 21 días.

- Consejo de cómo administrarlo

Debe aplicar el medicamento sobre la **conjuntiva**, sin poner en contacto la punta del envase con el ojo, debe dejar caer la gota sobre el ojo o aplicar la crema, luego debe mantener cerrados los ojos por 1 a 2 minutos.. El envase debe mantenerse cerrado de forma ajustada.

Debe lavarse las manos antes y después de la aplicación del producto.

- Uso prolongado

No lo use por más o menos tiempo que el señalado por su médico.

Si después de 7 días de uso los síntomas continúan o empeoran, debe acudir al oculista, nuevamente

3.- Precauciones

- Mayores de 60 años

No existe recomendación especial para los ancianos.

- Manejo de vehículos

Es poco probable que el medicamento afecte su capacidad de concentración y estado de alerta.

- Embarazo

No se ha observado que el uso de este medicamento durante el embarazo cause daño en el **feto**, aún así debe consultar con su médico antes de utilizar este medicamento si se encuentra embarazada o desea estarlo.

- Lactancia

Este medicamento puede ser **absorbido** y pasar a la leche materna, por lo que debe consultar al médico antes de usarlo si está amamantando.

- Lactantes y niños

El uso de este medicamento en niños debe ser previa consulta a su pediatra.

- Precauciones especiales

Este medicamento puede provocar una mayor sensibilidad de sus ojos a la luz solar, por esto se recomienda que utilice lentes de sol para exponerse a la luz brillante mientras se encuentra en tratamiento con idoxuridina.

No debe usarlo si la solución esta turbia o si cambia de color.

Es importante que no utilice una cantidad mayor que la que se le ha indicado

4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia a idoxuridina o a preparaciones que contengan yodo en su formulación.

Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.

5.- Interacciones

- Medicamentos

Usted debe consultar con el farmacéutico la conveniencia de usar este medicamento, si está utilizando otros, aunque al aplicarlo sobre la piel el riesgo de interacciones es bajo. En este caso se han descrito las interacciones con los siguientes medicamentos: productos oftálmicos que contengan ácido bórico.

6.- Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: un aumento excesivo de la sensibilidad de los ojos al sol, picazón, inflamación, enrojecimiento, dolor u otros signos de irritación que no estaban presentes antes de utilizar idoxuridina.

- Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: aumento en el flujo de lagrimas.

7.- Sobredosis

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

8.-Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona.