

LIDOCAINA CREMA TOPICA 4% CON PARCHES

Este medicamento puede ser empleado sin prescripción médica, no obstante es necesario que lo utilice cuidadosamente para obtener los mejores resultados. Consulte con su médico o farmacéutico si necesita más información

Composición:

Cada 100 g de crema contiene:

Lidocaína : 4g

Excipientes según lo aprobado en Registro.

El parche contiene una película de polieter poliuretano, adhesivo de acrilato y protectores de papel. Estos parches son hipoalergénicos y no contienen látex . Si usted cree que usted o su hijo son alérgicos a cualquiera de los componentes de la crema o del parche, consulte a su médico antes de usar.

¿Que es lidocaína?

Es un anestésico .

¿Para que se usa la lidocaína?

La lidocaína alivia el dolor causado por cortes y quemaduras leves, rasmilladuras, quemaduras de sol y picaduras de insectos.

¿Como actúa este medicamento?

Este medicamento contiene pequeñas esferas microscópicas de fosfolípidos, que actúan como contenedores microscópicos que ayudan a liberar la lidocaína a través de la piel. Una vez que ésta llega al terminal nervioso provoca un adormecimiento en la piel y tejidos cercanos. Después de la aplicación, usted puede sentir una sensación de frío seguido por un entumecimiento en el área cubierta por la crema. Las zonas de la piel no cubiertas de crema no presentaran efecto.

Aunque no es necesario cubrir el área tratada después de su aplicación, se recomienda cubrir el área tratada en niños para prevenir ingestión accidental o remoción de la crema .

Alternativamente puede emplearse un parche plástico limpio para proteger la zona tratada.

¿Como usar este medicamento?

Aplíquelo en las áreas afectadas no más de 3 o 4 veces por día. Antes de aplicar use un jabón suave y abundante agua para lavar la piel a tratar. No use limpiadores conteniendo alcohol o acetona pues quitaran los aceites naturales de la piel que son necesarios para ayudar a la penetración de la crema en la piel.

¿Como usar este medicamento en niños?

No aplicar a niños menores de 2 años de edad sin consultar al médico.

Se recomienda utilizar parche oclusivo en niños para prevenir la ingestión accidental así como para mantener la crema en el sitio deseado mientras la lidocaína es absorbida por la piel.

Instrucciones de aplicación

Instrucciones de aplicación con parche oclusivo:

1. Se recomienda utilizar parche oclusivo en niños pequeños o en otras situaciones para evitar que la crema sea removida antes de que la lidocaína sea absorbida.
2. Lavar la zona afectada con agua y jabón suave. No utilizar alcohol o acetona.
3. Primero aplicar una pequeña cantidad de crema sobre la piel, masajeando suavemente el área afectada. Luego aplicar suficiente crema para cubrir completamente el área afectada (aproximadamente 2 gramos de crema).
4. Cubra la crema con un parche transparente. Revise los bordes del parche asegurándose que la crema no se salga.

Instrucciones de aplicación sin parche oclusivo:

1. No es necesario utilizar parche, sin embargo se recomienda el uso de parches en niños pequeños o en otras situaciones para evitar que la crema sea removida antes de que ejerza su acción.
2. Lave la zona afectada con agua y jabón suave. No utilizar alcohol o acetona.
3. Primero aplicar una pequeña cantidad de crema sobre la piel, masajeando suavemente el área afectada. Luego aplicar suficiente crema para cubrir completamente el área afectada. Si usted nota que la crema se seca muy rápido después de su aplicación, agregue una pequeña cantidad adicional.

¿Que precauciones debe tener al usar este medicamento?

- Mientras dura la acción, la zona tratada estará insensible al dolor por lo que se debe tener cuidado de evitar que se produzcan nuevas lesiones.
- Sólo para uso externo.
- No aplique en la nariz o boca.
- En caso de ingestión comuníquese con su médico o con el centro asistencial más cercano.
- No aplique en los ojos o cerca de los ojos. Si entra en contacto con los ojos lave inmediatamente con abundante agua y cubra el ojo hasta que la sensibilidad se recupere. Posteriormente contrólese con un médico.
- No use dentro de los oídos.
- No use grandes cantidades especialmente en zonas muy sensibles o pliegues de la piel.
- La aplicación en zonas muy extensas o con excesiva frecuencia puede producir efectos adversos serios.

¿Hay efectos adversos asociados con el uso de este medicamento?

El efecto adverso más común es irritación, enrojecimiento, abrasión o rash. Aunque estos efectos adversos usualmente no requieren atención médica, si continúan o si son muy molestos, comuníquese con su médico. Si usted nota cualquier efecto inusual tal como visión borrosa, vértigo, somnolencia, dificultad par respirar, temblores, dolor de cabeza o palpitaciones, contáctese con su médico de inmediato.

Almacenamiento

Mantenga fuera del alcance de los niños. Mantenga el envase bien cerrado a temperatura señalada en el envase. No use después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

Presentación

De acuerdo a lo aprobado en Registro

Revisado el 21 de diciembre 2006