

<b>Nombre:</b> Lidocaína - Violeta de genciana <b>Condición de venta:</b> sin receta médica de uso tópico <b>Clasificación:</b> anestésico local - antiséptico <b>Disponible en:</b>	<b>Nombres de marca:</b>
---	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

#### 1.- ¿Para qué se usa?

Esta asociación de medicamentos se utiliza para el alivio de dolores leves y como antiséptico de lesiones bucales.

#### 2.- Administración (tópica)

##### - Rango y frecuencia

En 100 mL de solución: 2 g de lidocaína + 2 g de violeta de genciana.

Se debe aplicar sobre la zona afectada 3 o 4 veces al día, según la necesidad.

##### - Consejo de cómo administrarlo

Debe aplicar cubriendo toda la zona afectada, se recomienda usar antes de las comidas para así aliviar el dolor y permitir la ingesta de alimentos.

##### - Uso prolongado

Este medicamento no se debe usar por periodos prolongados de tiempo.

Se debe utilizar por 3 días seguidos si luego de este tiempo no mejoran los síntomas debe consultar con su médico.

#### 3.- Precauciones

##### - Mayores de 60 años

No existe recomendación especial para los ancianos.

##### - Manejo de vehículos

Es poco probable que el medicamento afecte su capacidad de concentración y estado de alerta.

##### - Embarazo

Este medicamento se absorbe en pequeña cantidad a través de la piel, es poco probable que su aplicación durante el embarazo cause daño en el **feto**, no obstante es preferible que consulte a su médico

##### - Lactancia

Este medicamento se absorbe en pequeña cantidad a través de la piel, es poco probable que pase a la leche materna.

#### Lactantes y niños

Se recomienda consultar al médico antes de usarlo en niños, especialmente en menores de 2 años, ya que la piel de los niños es más susceptible a absorber este medicamento y presentar mayor sensibilidad a los efectos adversos de lidocaína.

#### - Precauciones especiales

Si después de unos días, sus síntomas no mejoran o empeoran debe consultar con su médico.

No debe tragar este medicamento.

No debe utilizar este medicamento en zonas extensas de piel, especialmente si la piel presenta lesiones.

No debe aplicar sobre los ojos.

Debe consultar a su médico, antes de aplicarse este medicamento, si ha presentado síntomas de alergia a preservantes.

Debe recordar que este medicamento puede manchar la piel y la ropa.

#### 4.- Usted no debe usar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia a violeta de genciana, lidocaína u otro anestésico de uso tópico.

Si ha presentado alergia a algún excipiente de la formulación.

#### 5.- Interacciones

##### - Medicamentos

Aunque, al aplicar este medicamento sobre la piel el riesgo de interacciones es bajo, usted debe consultar con el farmacéutico la conveniencia de usar este medicamento, si está utilizando otros.

##### - Enfermedades

Usted debe consultar con farmacéutico la conveniencia de usar este medicamento, si padece de lesiones ulcerosa, ya que se puede tatuar la piel.

#### 6.- Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: reacciones de hipersensibilidad (alergia), tales como ronchas en la piel, hinchazón, dificultad para respirar.

##### - Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: irritación local, sensación de quemaduras, picazón.

#### 7.- Sobredosis

Si se aplica sobre heridas, áreas extensas de la piel o si se aplica con vendaje, existe la posibilidad de una mayor absorción y aparición de efectos adversos.

Lavar con abundante agua.

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: visión borrosa, confusión, convulsiones, mareos,

dolor de cabeza, temblores, zumbido de oídos, ritmo irregular del corazón, dificultad para respirar, ansiedad, excitación, nerviosismo.

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

**8. -Condiciones de almacenamiento:**

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

**No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico**

**No recomiende este medicamento a otra persona**