

<b>Nombre:</b> Levotiroxina <b>Condición de venta:</b> con receta médica <b>Clasificación:</b> agente hipotiroideo <b>Disponible en:</b>	<b>Nombres de marca:</b>
---	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

#### 1.- ¿Para qué se usa?

Este medicamento está indicado como terapia de reemplazo o sustitución de la función tiroidea ausente o deprimida. Supresión de la secreción de tirotrófina.

#### 2.- Administración (oral)

##### - Rango y frecuencia

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es de 1.6 microgramos/ Kg. De peso al día, aunque algunos pacientes necesitan más de 200 microgramos al día.

##### - Consejo de cómo administrarlo

Se recomienda que tome el medicamento en la mañana, antes del desayuno.

##### - Uso prolongado

Habitualmente los tratamientos con levotiroxina son de por vida, por lo que debe acudir periódicamente al médico para su control.

#### 3.- Precauciones

##### - Mayores de 60 años

Las dosis en ancianos suelen ser menores a las empleadas en adultos, ya que son más sensibles a los efectos de las **hormonas tiroideas**.

##### - Consumo de alcohol

Debe evitar el consumo de alcohol durante el tratamiento con levotiroxina, ya que este puede aumentar los efectos adversos del medicamento.

##### - Manejo de vehículos

Este medicamento puede causar en algunas personas mareos y / o disminuir sus capacidades mentales para reaccionar frente a **imprevistos**. Asegúrese del efecto que ejerce este medicamento sobre usted antes de manejar un vehículo o maquinaria peligrosa o realizar cualquier otra actividad riesgosa.

##### - Embarazo

Su médico debe evaluar la necesidad de utilizar este medicamento durante el embarazo y las dosis en las que debe utilizarlo.

##### - Lactancia

Al utilizar el medicamento en las dosis apropiadas, no se han observado problemas en los lactantes. Debe consultar al médico antes de usar este medicamento si está amamantando.

#### - Lactantes y niños

En los niños se recomienda evitar dosis excesivas, ya que pueden acelerar la edad ósea.

#### - Precauciones especiales

Se recomienda que utilice una identificación que indique que utiliza este medicamento. Este medicamento no debe ser usado para bajar de peso, puede provocar graves daños para su salud, sobre todo si se toma en conjunto con otros medicamentos para este mismo propósito.

#### 4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si padece de **tirototoxicosis** no tratada, a sufrido de **infarto** agudo de **miocardio** o insuficiencia adrenal.

Si ha presentado síntomas de alergia al medicamento.

Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.

#### 5.- Interacciones

##### - Medicamentos

Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta. En este caso se han descrito las interacciones con los siguientes medicamentos: amiodarona, antiácidos, warfarina, glibenclamida, digoxina, lovastatina, colestiramina, colestipol, medicamentos para el resfrío, clorfenamina, amfetaminas, medicamentos para inhibir el apetito,

##### - Enfermedades

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, cardiovascular o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el caso particular de este medicamento, si padece de **diabetes mellitus**, **diabetes insípida**, **mixedema**, **aterosclerosis**, **insuficiencia coronaria**, **insuficiencia cardíaca**, **angina de pecho**.

##### - Exámenes de laboratorio

La levotiroxina puede alterar los resultados de los análisis de sangre, por lo que si le van a realizar un examen debe avisar que está tomando este medicamento.

#### 6.- Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: dolores de cabeza severos, **rash**, ritmo cardíaco irregular o rápido, dolor de pecho, dificultad para respirar.

##### - Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: adelgazamiento, ansiedad, palpitaciones, sudoración, taquicardia, **hipertensión**, dolor de cabeza, **insomnio**, fiebre sequedad de piel, diarrea.

#### 7.- Sobredosis

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: **taquicardia**, dolor de pecho, dificultad para respirar. Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la intoxicación y tratarla adecuadamente. Debe llevar el envase del medicamento que se ha tomado.

**8. -Condiciones de almacenamiento:**

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

**No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico**

No recomiende este medicamento a otra persona.