

<b>Nombre:</b> Lincomicina <b>Condición de venta:</b> con receta médica <b>Clasificación:</b> antibiotico <b>Disponible en:</b>	<b>Nombres de marca:</b>
--	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

### 1.- ¿para qué se usa?

Este medicamento está indicado en el tratamiento de infecciones graves de la piel y tejidos blandos causados por cepas susceptibles de estreptococos, pneumococos y estafilococos.

**Este medicamento exige diagnostico y supervisión médica.**

### 2.- Administración (oral)

#### - Rango y frecuencia

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es:

#### ❖ adultos:

- Infecciones serias: 500 mg. cada 8 horas.
- Infecciones más graves: 500 mg. cada 6 horas.

#### ❖ Niños sobre un mes de edad:

- Infecciones serias: 30 mg./Kg./día divididos en 3 a 4 dosis iguales.
- Infecciones más graves: 60 mg./Kg./día divididos en 3 a 4 dosis iguales.

Debe evitar olvidar alguna toma y respetar los horarios.

Si no cumple el tratamiento lo más probable es que la enfermedad se vuelva a presentar con mayor intensidad y este medicamento ya no le servirá para detener la infección.

#### - Consejo de cómo administrarlo

Se recomienda tomar con un vaso de agua, 1 hora antes o 2 horas después de las comidas

#### - Uso prolongado

Debe usarlo durante el tiempo que su médico se lo señale, respetando los horarios y las dosis.

No debe suspender el medicamento sin que su médico le indique, esto puede causar que la infección vuelva a instaurarse.

### 3.- Precauciones

#### - Mayores de 60 años

No existe recomendación especial para los ancianos.

#### - Consumo de alcohol

Evite el consumo de alcohol mientras está en tratamiento con este medicamento, ya que se aumentan los riesgos de efectos adversos de lincomicina.

#### - Manejo de vehículos

Es poco probable que el medicamento afecte su capacidad de concentración y estado de alerta.

#### - Embarazo

No se ha reportado que el uso de este medicamento durante el embarazo cause daño en el feto.

#### - Lactancia

Este medicamento pasa a la leche materna, sin embargo, no se ha observado que su uso durante la lactancia cause daño en el niño. Converse con su médico la conveniencia de seguir el tratamiento o dejar de amamantar.

#### - Lactantes y niños

El uso de este medicamento en niños debe ser previa consulta a su pediatra.

#### - Precauciones especiales

Antes de que le apliquen anestesia general, su médico o su dentista, debe informar que se encuentra en tratamiento con este medicamento.

Si usted presenta diarrea mientras está en tratamiento con este medicamento comuníquese con su médico antes de tomar cualquier medicina para detener la diarrea.

#### 4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia a clindamicina, lincomicina o doxorrubicina.

Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.

En algunos casos se recomienda no iniciar el tratamiento si el paciente presenta diarrea moderada o severa.

#### 5.- Interacciones

##### - Medicamentos

Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta. En este caso se han descrito las interacciones con los siguientes medicamentos: cloramfenicol, atapulguita, eritromicina.

##### - Enfermedades

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, cardiovascular o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el caso particular de este medicamento, si padece de colitis o alguna otra enfermedad estomacal.

#### 6.- Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: calambres estomacales, diarrea severa, heces con sangre, fiebre, fatiga, rash, picazón, aparición de moretones inusuales.

##### - Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: diarrea leve, náuseas y vómito leves, dolor de estomago, picazón del ano o el área genital.

#### 7.- Sobredosis

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: calambres estomacales, diarrea severa, heces con sangre, fiebre, rash, picazón, aparición de moretones inusuales.

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

**8. -Condiciones de almacenamiento:**

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

**No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico**  
**No recomiende este medicamento a otra persona.**



