

Nombre: Loperamida Condición de venta: con receta médica Clasificación: antidiarreico Disponible en:	Nombres de marca:
---	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

1.- ¿Para qué se usa?

Este medicamento es utilizado en el tratamiento sintomático de diarreas agudas no específicas.

2.- Administración (oral)

- Rango y frecuencia

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es:

❖ Adultos:

- Diarrea aguda: Inicialmente 4 mg., luego 2 mg. después de cada evacuación.
- Diarrea crónica: 4 mg. inicialmente, luego se continúa con 2 mg. después de cada evacuación líquida hasta que se controle la diarrea. La dosis de mantenimiento es de 4 a 8 mg. en varias dosis según necesidad. La dosis máxima recomendada es de 16 mg.

❖ Niños:

- Diarrea aguda: Inicialmente 80-240 microgramos/Kg. De peso al día repartidos en 2 o 3 tomas.
- Niños de 2 a 5 años: 1 mg. tres veces al día.
- Niños de 5 a 8 años: 2 mg. dos veces al día.
- Niños de 8 a 12 años: 2 mg. tres veces al día.

- Consejo de cómo administrarlo

Se puede tomar loperamida con el estómago vacío o lleno. Se recomienda que siga una dieta liviana y que tome bastante líquido.

- Uso prolongado

No debe usar loperamida por más de 2 días seguidos, sin consultar a su médico. Su uso prolongado puede esconder una enfermedad grave y síntomas de deshidratación producidos por la diarrea.

3.- Precauciones

- Mayores de 60 años

Loperamida puede esconder síntomas de deshidratación en pacientes ancianos, por lo que se recomienda especialmente beber mucho líquido durante el tratamiento.

- **Consumo de alcohol**

Se debe evitar el alcohol, mientras se encuentre en tratamiento con este medicamento, ya que empeora los síntomas de su enfermedad.

- **Manejo de vehículos**

Este medicamento puede causar en algunas personas mareos y / o disminuir sus capacidades mentales para reaccionar frente a **imprevistos**. Asegúrese del efecto que ejerce este medicamento sobre usted antes de manejar un vehículo o maquinaria peligrosa o realizar cualquier otra actividad riesgosa.

- **Embarazo**

Este medicamento puede causar daño al **feto**, usted debe consultar al médico, antes de usar este medicamento si está embarazada.

- **Lactancia**

Este medicamento pasa a la leche materna y puede afectar al lactante. Converse con su médico la conveniencia de seguir el tratamiento o dejar de amamantar.

- **Lactantes y niños**

Su pediatra debe evaluar si el medicamento puede ser utilizado por niños menores de 2 años.

4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia al medicamento.

Si ha presentado alergia a algún excipiente de la formulación.

No use este medicamento si junto con la diarrea tiene fiebre o hay presencia de sangre o moco en las **heces**.

Si tiene diarrea causada por antibióticos o disentería.

5.- Interacciones

- **Medicamentos**

Avisé a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta, particularmente colestiramina, teofilina, antibióticos en general, medicamentos opiáceos como la morfina.

- **Enfermedades**

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, cardiovascular o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el caso particular de este medicamento, si padece de **obstrucción intestinal, colitis ulcerosa, colitis pseudomembranosa** causada por el empleo de antibióticos, **disentería, colitis, colitis**.

- **Alimentos**

Debe evitar consumir alimentos que pueden aumentar la diarrea, como: frutas, comidas picantes o fritas, salvado, golosinas y alimentos o bebidas que contengan **cafeína**.

6.- Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: hinchazón, **rash, constipación**, pérdida del apetito, dolor de estómago, náuseas, vómitos.

- **Otros efectos**

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al

medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: **estreñimiento**, sequedad de boca.

7. - Sobredosis

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: **constipación**, depresión del sistema nervioso central, irritación **gastrointestinal**, depresión respiratoria, vómitos.

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

8. - Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona.